

Chapitre VII

Vecteurs, droites et plans de l'espace


I - Vecteurs de l'espace

1.1 Définitions et règles de calcul.



La notion de vecteur vue en géométrie plane se généralise à l'espace.

1. A tout couple de points (A, B) de l'espace, on associe le vecteur \vec{AB} défini comme suit :

- Lorsque A et B sont distincts, le vecteur \vec{AB} a :
 - Pour direction celle de la droite (AB).
 - Pour sens celui de A vers B.
 - Pour longueur (synonyme norme) la distance AB. On note : $\|\vec{AB}\| = AB$.
- Lorsque A et B sont confondus, le vecteur \vec{AA} est le vecteur nul noté $\vec{0}$.




On dit que deux vecteurs non nuls sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. On note : $\vec{u} = \vec{AB} = \vec{CD}$ (voir figure ci-contre).



2. Lorsque quatre points A, B, C, D ne sont pas alignés on a :

$\vec{AB} = \vec{CD}$ équivaut à dire que le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme.


On appelle représentant d'un vecteur \vec{u} donné tout vecteur égal à \vec{u} .



3. Pour tout point A de l'espace et tout vecteur \vec{u} , il existe un unique point B tel que : $\vec{u} = \vec{AB}$.


4. Les règles de calculs sur les vecteurs sont les mêmes qu'avec les vecteurs du plan.

6 Toujours faire un croquis lorsqu'on parle de parallélogramme : attention à l'erreur classique : "ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\vec{AB} = \vec{CD}$ " : c'est faux : regardez-ci-dessous, \vec{AB} et \vec{CD} ne sont pas égaux mais opposés car pas le même sens. Au passage, l'opposé du vecteur \vec{CD} c'est \vec{DC} avec pour notation : $-\vec{CD} = \vec{DC}$



La relation de Chasles dit que : pour tout point A, B et C de l'espace, $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

Illustration :




Elle est applicable à plus de deux vecteurs. Par exemple : $\vec{IJ} + \vec{JK} + \vec{KL} = \vec{IL}$

Notons que la relation de Chasles donne un moyen simple d'additionner deux vecteurs de l'espace. Dans le cas fréquent où l'extrémité du premier vecteur n'est pas identique à l'origine du second vecteur, on peut toujours, en utilisant un représentant d'un des vecteurs, se ramener à utiliser la relation de Chasles.

Exemple

A l'aide des points de la figure ci-dessous qui est un pavé droit (= parallélépipède rectangle), donner :



i) un représentant du vecteur : $\vec{AD} + \vec{CG} \rightarrow \vec{AH}$

ii) Le représentant d'origine E du vecteur $\vec{EH} + \vec{EF} + \vec{EA}$

Enfin dire qu'un point D est l'image d'un point C par la translation de vecteur \vec{AB} signifie que

$\hookrightarrow \vec{AB} = \vec{CD}$

i) $\vec{AD} + \vec{CG} = \vec{AD} + \vec{DH}$ car $\vec{CG} = \vec{DH}$ car que DCGH est un rectangle ou un pgm


ii) $\vec{EH} + \vec{EF} + \vec{EA} = \vec{EH} + \vec{HG} + \vec{GC} = \vec{EC}$
 de \vec{EC} est la représentation d'un vecteur E de $\vec{EH} + \vec{EF} + \vec{EA}$

Illustration :
 Quelle est l'image du point H par la translation de vecteur \vec{DB} sur la figure ci-dessus ? pt F

1.2 Vecteurs colinéaires

Rappel


- Soit k un réel non nul et \vec{u} un vecteur non nul. Le vecteur $k\vec{u}$ est tel que :
- $k\vec{u}$ et \vec{u} ont la même direction ;
 - si $k > 0$, alors $k\vec{u}$ et \vec{u} ont le même sens, sinon, ils sont de sens contraire ;
 - $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.



On rappelle que $|k| = \begin{cases} k & k > 0 \\ -k & k < 0 \end{cases}$

$\| -2\vec{u} \| = |-2| \times \|\vec{u}\| = 2\|\vec{u}\|$

Illustration :




$\vec{AT} = \vec{AD} + 2\vec{AB} = \vec{AD} + \vec{DT}$

Construire ci-dessus les point R, S et T définis par : $\vec{BR} = \frac{1}{2}\vec{CD}$; $\vec{CS} = -2\vec{CD}$ et $\vec{AT} = \vec{AD} + 2\vec{AB}$.

Définition

Deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} non nuls sont colinéaires équivaut à dire qu'ils ont la même direction, autrement dit : \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires s'il existe un nombre réel k tel que : $\vec{v} = k\vec{u}$.

On convient que le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur de l'espace.



Propriété phare :
 A, B, C et D sont quatre points distincts de l'espace.
 1) Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si \vec{AB} et \vec{CD} sont colinéaires.
 2) Les points A, B et C sont alignés équivaut à dire que les vecteurs \vec{AB} et \vec{AC} sont colinéaires.


Attention, cette propriété sera d'un usage fréquent dans ce chapitre, surtout quand on disposera des coordonnées des points et des vecteurs.

Point 2) : prenez le temps de bien le comprendre : les deux vecteurs \vec{AB} et \vec{AC} sont colinéaires équivaut à dire que les droites (AB) et (AC) sont parallèles : or deux droites parallèles qui ont un point en commun, ici A, sont confondues : les trois points A, B et C sont sur la même droite et donc alignés !!!

Exercice

- 1) Construire un tétraèdre ABCD, puis construire les points M et N définis par : $\vec{BM} = \frac{1}{3}\vec{BA}$ et $\vec{CN} = 2\vec{BC}$.
- 2) Démontrer que les droites (MC) et (AN) sont parallèles.

exo 1 :



⇒ Tétraèdre = solide à 4 faces triangulaires


2) Montrons par ex que : \vec{MC} et \vec{AN} sont colinéaires

$\vec{MC} = \vec{MB} + \vec{BC} = -\frac{1}{3}\vec{BA} + \vec{BC} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \vec{BC} \Rightarrow \vec{MC}$ est une combinaison linéaire de \vec{AB} et \vec{BC}

$\vec{AN} = \vec{AC} + \vec{CN} = \vec{AC} + 2\vec{BC}$

⇒ $\vec{AN} = 3\vec{MC}$

\vec{AN} et \vec{MC} sont colinéaires de (AN) et (MC) sont //



1.3 Combinaison linéaire de vecteurs

Définition

Soit \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs non nuls.

Un vecteur \vec{w} est appelé une **combinaison linéaire** des vecteurs \vec{u} et \vec{v} s'il existe des réels a et b tels que : $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$


Exemple : la relation : $\vec{DR} = \frac{1}{4}\vec{DB} + \frac{3}{2}\vec{DC}$ permet de dire que le vecteur \vec{DR} est une combinaison linéaire des vecteurs \vec{DB} et \vec{DC} .

Bien évidemment, cette définition se généralise à une combinaison linéaire de 3 vecteurs ou plus.

Cette année, on utilisera fréquemment des combinaisons linéaires de trois vecteurs :

Reprenons le pavé droit ci-dessous :

Ecrire \vec{AG} comme combinaison linéaire des vecteurs \vec{AB} , \vec{AD} et \vec{AE} .



$$\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}$$

Exercice 2


$SABCD$ est une pyramide de sommet S et dont la base est un carré $ABCD$ de centre I .

a) Faire une figure.

b) Exprimer \vec{SI} comme combinaison linéaire des vecteurs \vec{SA} et \vec{SC} .

c) En déduire que \vec{SD} est une combinaison linéaire (à préciser) des vecteurs \vec{SA} , \vec{SB} et \vec{SC} .

2x02 :



b) $\vec{SI} = \vec{SA} + \vec{AI}$ et $\vec{SI} = \vec{SC} + \vec{CI}$

de $\vec{SA} + \vec{AI} + \vec{SC} + \vec{CI} = 2\vec{SI}$ or $\vec{AI} + \vec{CI} = \vec{0}$ car I milieu $[AC]$

$$2\vec{SI} = \vec{SA} + \vec{SC}$$

$$\vec{SI} = \frac{1}{2}(\vec{SA} + \vec{SC}) = \left(\frac{1}{2}\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SC}\right)$$

c) Par chocs : $\vec{SD} = \vec{SI} + \vec{ID} = \frac{1}{2}\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SC} + \vec{ID}$

or $\vec{ID} = -\vec{IB} = -(\vec{IS} + \vec{SB})$

de $\vec{SD} = \frac{1}{2}\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SC} - \vec{IS} - \vec{SB} = \frac{1}{2}\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SC} + \vec{SI} - \vec{SB}$

$$\vec{SD} = \frac{1}{2}\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SC} + \frac{1}{2}\vec{SA} + \frac{1}{2}\vec{SC} - \vec{SB} = \vec{SA} - \vec{SB} + \vec{SC}$$

II - Droites et plan de l'espace

Tout d'abord, intuitivement, un plan est une surface "plate" illimitée. Par exemple le plan formé par le tableau est un exemple de plan. Il se représente dans l'espace par un parallélogramme lorsqu'il est regardé non frontalement, et par un rectangle sinon.


Exemples : Sur la figure précédente, le plan contenant le rectangle $ABCD$ est représenté par un parallélogramme (car non vu non frontalement), tandis que le plan contenant le rectangle $ABFE$ est représenté par un rectangle car vu frontalement.

1) Règles d'incidence

Quelques axiomes utiles (appelés règles d'incidence) et utilisés en permanence durant tout le chapitre...

1) Par deux points distincts de l'espace, il passe une **unique** droite.

Illustration :




on note (AB) la droite passant par A et B .

2) Trois points non alignés de l'espace définissent un **unique** plan.


Notation et illustration : si A , B et C ne sont pas alignés, le plan passant par les points A , B et C est noté : (ABC) . **Remarque :** (BCA) désigne le même plan que (ABC) !

3) Si deux points A et B sont distincts et qu'ils appartiennent à un même plan (\mathcal{P}) , alors la droite (AB) est incluse dans ce plan (\mathcal{P}) .

$= (BCA) = (BAC)$
 (ABC) : le plan contenant A, B et C



Exercice 3 :




Si $A \in \mathcal{P}$ et $B \in \mathcal{P}$ ($A \neq B$)
 alors $(AB) \subset \mathcal{P}$.

Les propriétés connues de géométrie plane s'appliquent dans chaque plan de l'espace.

Exemples

Dans le cube $ABCDEFGH$ ci-contre :



a) Donner 4 noms différents du plan (\mathcal{P}) ci-contre.

b) Expliquer pourquoi la droite qui passe par A et par le point O intersection des droites (EC) et (AG) est contenue dans le plan (\mathcal{P}) .

c) Démontrer que (EG) et (AC) sont parallèles.

a) (AEG) ; (ACG) ; (CEA) ; (EGC) .

b) $A \in (\mathcal{P})$ d'après la question a)

(EC) et (AG) sont sécantes en O et incluses dans (\mathcal{P}) de $O \in (\mathcal{P})$.

Or A et O sont distincts de d'après la 3^e règle d'incidence :

(AO) est contenue dans le plan (\mathcal{P}) .

c) $\vec{EA} = \vec{GC}$ car $ABCDEFGH$ est un cube.

de $EACG$ est un rectangle pgm de il a ses côtés opposés // de
 $(EG) // (AC)$ ($\vec{EG} = \vec{AC}$).

2) Droites de l'espace

Propriété (caractérisation vectorielle d'une droite de l'espace)

Soient A et B deux points distincts de l'espace noté \mathcal{E} .


La droite (AB) est l'ensemble des points M de l'espace tels que les vecteurs \vec{AM} et \vec{AB} sont colinéaires.

Traduction mathématique de la phrase précédente : le \exists signifie : il existe (au moins un).

$$(AB) = \{M \in \mathcal{E} / \exists t \in \mathbb{R} / \vec{AM} = t\vec{AB}\}.$$

Cette caractérisation d'une droite nous servira pour en donner une représentation paramétrique des droites de l'espace.

Preuve : Comprenez bien qu'où que soit placé le point M sur la droite (AB) , les vecteurs \vec{AM} et \vec{AB} sont colinéaires !!!




\vec{AM} et \vec{AB} sont colinéaires signifie, par définition même de deux vecteurs colinéaires, qu'il existe un réel t tel que : $\vec{AM} = t\vec{AB}$!!

Remarques importantes

1. \vec{AB} est appelé un vecteur directeur de la droite (AB) . On dit encore que la droite (AB) est dirigée par le vecteur \vec{AB} .

$\vec{BA} = -\vec{AB}$ est un autre vecteur directeur de la droite (AB) , tout comme $1,84\vec{AB}$, donc évitez de dire le vecteur directeur de la droite (AB) , il y a une différence fondamentale entre un article indéfini (non-unicité) et un article défini (unicité) !!


BAC) ...
 m contenant



Une droite admet une infinité de vecteurs directeurs : si \vec{u} désigne l'un d'eux, alors, pour tout réel k non nul, $k\vec{u}$ est également un autre vecteur directeur de cette droite !

2. On retiendra que comme dans le plan, une droite peut être définie par la donnée d'un point A et d'un vecteur \vec{u} non nul, appelé vecteur directeur de la droite.


Illustration : La droite passant par le point A et dirigée par le vecteur \vec{u} est parfois notée $\mathcal{D}(A; \vec{u})$.



3. Deux droites de l'espace sont parallèles si et seulement si elles ont des vecteurs directeurs colinéaires.

6. Capital pour les exercices.

Illustration :



$(d) \parallel (d') \iff \vec{u}$ et \vec{v} sont colinéaires si \vec{u} dirige (d) et \vec{v} dirige (d') .

2 - Vecteurs et plans de l'espace

Théorème (caractérisation vectorielle d'un plan de l'espace).


Soit A, B et C trois points non alignés de l'espace noté \mathcal{E} .

Ces 3 points définissent le plan (ABC)

Le plan (ABC) est l'ensemble des points M de \mathcal{E} tels que le vecteur \vec{AM} soit une combinaison linéaire des vecteurs \vec{AB} et \vec{AC} c'est-à-dire tels que : $\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$ avec x et y réels.

$(ABC) = \{M \in \mathcal{E} \mid \exists (x; y) \in \mathbb{R}^2 \mid \vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}\}$.

Illustration :



Preuve : conséquence directe du fait que A, B et C ne soient pas alignés, donc le repère $(A; \vec{AB}; \vec{AC})$ est un repère du plan, et d'après le cours de première, tout vecteur \vec{AM} se décompose de façon unique suivant les vecteurs \vec{AB} et \vec{AC} .

Remarques fondamentales

Dans le cadre du théorème précédent, on dit que les vecteurs \vec{AB} et \vec{AC} sont des vecteurs directeurs du plan (ABC) .


Un plan possède une infinité de couples de vecteurs directeurs. Pourquoi ?

Car si $(\vec{AB}; \vec{AC})$ est un couple de vecteurs directeurs du plan, il en est de même pour le couple formé par : $(k\vec{AB}; l\vec{AC})$ où $k \in \mathbb{R}^*$ et $l \in \mathbb{R}^*$

On peut définir un plan \mathcal{P} par la donnée d'un point A et de deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} non colinéaires.


On notera : $\mathcal{P} = (A; \vec{u}; \vec{v})$ un tel plan. Un couple de vecteurs non colinéaires du plan \mathcal{P} est appelé une base du plan \mathcal{P} .

Illustration : \mathcal{P}



Exemple

Dans le pavé droit ci-dessous, définir le plan (EHD) par la donnée d'un point et d'un couple de vecteurs non colinéaires. Citer trois points appartenant au plan $(G; \vec{AB}; \vec{AD})$.



$(EHD) = (E; \vec{ED}; \vec{EH})$ ou $(END) = (D; \vec{DE}; \vec{DH})$.
non colinéaires et dans (EHD) .

Plan $(G; \vec{AB}; \vec{AD}) = (EHG)$
 $\hookrightarrow \mathcal{P}$
 $E \in \mathcal{P}$
 $F \in \mathcal{P}$
 $G \in \mathcal{P}$
 $H \in \mathcal{P}$

Définition (points coplanaires)

Des points de l'espace sont dits coplanaires s'il existe un plan qui contient tous ces points.


Dans l'exemple précédent, les points A, B, C et D sont coplanaires car contenus dans le plan (ABC).

Trois points de l'espace sont toujours coplanaires.

S'il n'existe aucun plan contenant 4 points donnés (ou plus), on dit que ces points ne sont pas coplanaires !

C'est par exemple le cas lorsqu'on a un tétraèdre ABCD : les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires !


Enfin, comme nous le verrons au paragraphe position relative de droites et de plans, deux droites de l'espace parallèles sont toujours coplanaires.



Définition (vecteurs coplanaires)

Dire que trois vecteurs de l'espace sont coplanaires signifie que lorsqu'on choisit un point O quelconque de l'espace, les extrémités des représentants de ces vecteurs d'origine O sont coplanaires avec O.

Donc, dire que \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} sont coplanaires équivaut à dire que les quatre points O, A, B et C sont coplanaires, où O est un point quelconque de l'espace, et A, B et C étant les points définis par : $\vec{OA} = \vec{u}$; $\vec{OB} = \vec{v}$ et $\vec{OC} = \vec{w}$.




Attention à ne pas confondre vecteurs coplanaires et vecteurs colinéaires : ça n'a rien à voir !!!

Exemple : Dans le cube ci-contre :

\vec{AB} , \vec{AC} et \vec{AD} sont trois vecteurs coplanaires.

Par contre, \vec{AB} , \vec{AD} et \vec{AE} ne sont pas coplanaires !



Théorème (permet de démontrer que 3 vecteurs sont coplanaires, utile pour les exercices)

Soit \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} trois vecteurs de l'espace tels que \vec{u} et \vec{v} ne soient pas colinéaires.

Les vecteurs \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} sont coplanaires si et seulement si il existe des nombres réels x et y tels que : $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Preuve : Fixons un point O de l'espace. Soit A, B et C les points définis par : $\vec{u} = \vec{OA}$; $\vec{v} = \vec{OB}$; $\vec{w} = \vec{OC}$. Vu que \vec{u} et \vec{v} ne sont pas colinéaires, les points O, A et B ne sont pas alignés et définissent donc le plan (OAB).

\vec{u} , \vec{v} et \vec{w} sont coplanaires si et seulement si O, A, B et C sont coplanaires, ce qui équivaut à dire que le point C appartient au plan (OAB).

D'après le théorème précédent de caractérisation vectorielle d'un plan de l'espace, C appartient au plan (OAB) équivaut donc à dire qu'il existe des réels x et y tels que : $\vec{OC} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$.

Ainsi, \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} sont coplanaires si et seulement si il existe des réels x et y tels que : $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Conséquence importante

Dire que quatre points A, B, C et D de l'espace sont coplanaires équivaut à dire que les vecteurs : \vec{AB} , \vec{AC} et \vec{AD} sont coplanaires.

Utile en exercice, cf. ci-après.

Exercice 3


Soit ABCD un tétraèdre, et M le point tel que : $\vec{AM} = 3\vec{BM} + \vec{CM}$.

1) Exprimer \vec{AM} comme combinaison linéaire des vecteurs \vec{AB} et \vec{AC} .

2) En déduire que les points A, B, C et M sont coplanaires.

par théorème : \vec{AM} , \vec{AB} et \vec{AC} sont coplanaires de A, M, B, C sont coplanaires

ex 3



1) $\vec{AM} = 3\vec{BM} + \vec{CM}$: on fait choses

$\vec{AM} = 3(\vec{BA} + \vec{AM}) + \vec{CA} + \vec{AM}$

$\vec{AM} = 3\vec{BA} + 3\vec{AM} + \vec{CA} + \vec{AM}$

$\vec{AM} - 3\vec{AM} - \vec{AM} = 3\vec{BA} + \vec{CA}$

$-3\vec{AM} = 3\vec{BA} + \vec{CA}$

$\vec{AM} = \frac{3\vec{BA} + \vec{CA}}{-3}$

$\vec{AM} = -\vec{BA} - \frac{1}{3}\vec{CA} = \vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$

cbl de \vec{AB} et \vec{AC}

2) AB et AC ne sont pas colinéaires car ABC est un triangle.

\vec{AM} est une cbl de \vec{AB} et \vec{AC} de

par théorème : \vec{AM} , \vec{AB} et \vec{AC} sont coplanaires de A, M, B, C sont coplanaires

III- Repères de l'espace


Définition

On appelle base de l'espace tout triplet de vecteurs non coplanaires.

Dire que $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ est une base de l'espace signifie donc que les trois vecteurs \vec{i}, \vec{j} et \vec{k} ne sont pas coplanaires.

Exemple

SABCD est la pyramide à base carrée représentée ci-contre.
I est un point de [AB] distinct des points A et B.
Dire dans chaque cas si le triplet de vecteurs est une base de l'espace.
a) $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AS})$
b) $(\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SI})$



a) $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AS})$ forment une base de l'espace car $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AS}$ ne sont pas coplanaires (pyramide).

b) $(\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SI})$ ne forment pas une base de l'espace car $\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SI}$ sont coplanaires et contenus dans le plan (ASB).


Définition

On appelle repère de l'espace, la donnée d'un point O (appelé l'origine du repère) et d'une base $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace.

On note $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ un tel repère de l'espace.

Illustration :

L'axe (O, \vec{i}) , c'est-à-dire la droite passant par le point O et dirigée par le vecteur \vec{i} , est appelé l'axe des abscisses du repère.
L'axe (O, \vec{j}) est appelé l'axe de ordonnées.
L'axe (O, \vec{k}) est appelé l'axe des cotes.



Attention, l'ordre des vecteurs de la base $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ est fondamental ! Changer l'ordre de ces vecteurs revient à changer de repère !!

Bien évidemment, on peut prolonger chaque axe de part et d'autre de O , on ne le fait pas pour ne pas trop surcharger la représentation spatiale.

La propriété suivante généralise celle que vous utilisez dans le plan en géométrie repérée :

Propriété

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ un repère de l'espace.


Pour tout point M de l'espace, il existe un unique triplet $(x; y; z)$ de réels tels que : $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

$(x; y; z)$ sont les coordonnées du point M dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

x est appelée l'abscisse du point M , y l'ordonnée du point M et z la cote du point M .

On notera : $M(x; y; z)$ les coordonnées du point M dans ce repère.

Illustration fondamentale :



Pour la pt d'intersection du plan (O, \vec{i}, \vec{j}) et de la droite $\parallel \vec{k}$ passant par M .

coordonnées :

$\Rightarrow P(x_M; y_M; 0)$
 $S(0; 0; z_M)$ $R(0; y_M; 0)$
 $Q(x_M; 0; 0)$

Pour lire graphiquement les coordonnées d'un point M de l'espace dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on procède comme suit :

On trace la parallèle à (O, \vec{k}) passant par le point M : cette dernière traverse le plan $(O; \vec{i}; \vec{j})$ en le point nommé P .

Depuis P on trace la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui coupe l'axe des abscisses en le point Q dont l'abscisse est x_M .

On trace la parallèle à l'axe des abscisses qui coupe l'axe des ordonnées en le point R qui a pour ordonnée y_M .


Enfin, la parallèle à (OP) passant par le point M coupe l'axe des ordonnées en le point S de cote z_M .

Un point de l'espace est donc repéré dans un repère de l'espace par trois nombres. (Cela justifie la terminologie "espace de dimension 3").

$W(0; 0; z_0)$ $U(0; y_0; 0)$
 $V(x_0; 0; 0)$

Exemple


Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, on a représenté les points A et B :



Lire graphiquement les coordonnées des points A et B

Exercice 4

ABCDEFGH est le cube représenté ci-contre.
Donner les coordonnées de chacun des sommets du cube dans le repère $(O; \vec{DA}, \vec{DC}, \vec{DH})$.



- $D(0,0,0)$ $A(1,0,0)$ $C(0,1,0)$ $H(0,0,1)$
 $B(1,1,0)$ $E(1,0,1)$ $F(1,1,1)$
 $G(0,1,1)$

On sait que pour tout vecteur \vec{u} de l'espace, il existe un unique point M tel que $\vec{OM} = \vec{u}$.
On définit les coordonnées du vecteur \vec{u} comme celles du point M dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.
Pour tout vecteur \vec{u} , il existe un unique triplet de réels $(x; y; z)$ tel que : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

Cela traduit le fait que tout vecteur de l'espace peut se décomposer suivant trois vecteurs non coplanaires de l'espace.

On notera $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ les coordonnées du vecteur \vec{u} dans la base $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

La notation en colonne des coordonnées d'un vecteur est rigoureuse, et permet lorsqu'on débute, de distinguer les coordonnées d'un vecteur de celles d'un point. Pensez-y !

Point crucial : Si le repère s'appelle $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, alors on a : $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \vec{i} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \vec{j} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \vec{k}$, il faut savoir

instantanément donner les coordonnées des vecteurs unitaires formant la base de votre repère.

Définition
Décomposer un vecteur \vec{u} dans une base $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ c'est écrire le vecteur \vec{u} sous la forme :

$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, où x, y et z sont des réels respectivement appelés : première coordonnée (ou abscisse), seconde coordonnée (ou ordonnée), troisième coordonnée (ou cote) du vecteur \vec{u} dans la base $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

Exercice 5 :

(-1)

repère $(A; \vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$
 $\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ x & y & z \end{matrix}$

a) $\vec{AC} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AE} \Rightarrow$ on cherche les réels $x; y; z$

$C(1; 1; 0)$ de $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$ ($= 1\vec{AB} + 1\vec{AD} + 0\vec{AE}$).


b) $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}$ car $G(1; 1; 1)$.

c) $\vec{GB} \begin{pmatrix} 1-1=0 \\ 0-1=-1 \\ 0-1=-1 \end{pmatrix}$ car $G(1; 1; 1)$ et $B(1; 0; 0)$ de $\vec{GB} = 0\vec{AB} + (-1)\vec{AD} + (-1)\vec{AE}$
 $\vec{GB} = -\vec{AD} - \vec{AE}$

d) $D(0; 1; 0)$ et $F(1; 0; 1)$ de $\vec{DF} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ de $\vec{DF} = \vec{AB} - \vec{AD} + \vec{AE}$

Exercice 5

ABCDEFGH est le cube représenté ci-contre.
Dans chaque cas, donner la décomposition du vecteur dans la base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.



- a) \vec{AC} b) \vec{AG} c) \vec{GB} d) \vec{DF}

Formulaires récapitulatifs relatifs aux coordonnées

Tous les résultats de géométrie plane connus concernant les coordonnées s'étendent à l'espace en ajoutant une troisième coordonnée.

Elles sont d'un usage fréquent dans tous les exercices de bac, alors mémorisez-les une fois pour toutes !!!

1. Soit $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ un repère de l'espace, et $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ dans ce repère.

Alors : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \\ z+z' \end{pmatrix}$ et pour tout réel k , $k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \\ kz \end{pmatrix}$

Pour additionner deux vecteurs, on additionne donc respectivement les coordonnées de même nom entre elles, et multiplier un vecteur par un réel revient à multiplier par chaque de ses coordonnées !

2. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si : ils ont les mêmes coordonnées.

Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$. $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}$

3. Deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles.

4. Soit A et B deux points de l'espace.

Si dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on a : $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$, alors :

* Le vecteur \vec{AB} a pour coordonnées : $\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$ (dans tous les exercices de bac).

Extrémité moins origine comme dit maladroitement le dog, en rappelant que l'origine du vecteur \vec{AB} est le point A et son extrémité le point B !!!

** Le milieu I du segment [AB] a pour coordonnées : $I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$

Essayez de ne pas confondre coordonnées du milieu et coordonnées d'un vecteur.

Chaque année, c'est une erreur fréquente qui montre une grosse capacité de mémorisation....

exemple :

1) I est le milieu de \vec{AB} on $A(1; 0; 0)$ et $B(1; 1; 0)$

donc $I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right) = I \left(\frac{1+1}{2}; \frac{0+1}{2}; \frac{0+0}{2} \right)$

$I \left(1; \frac{1}{2}; 0 \right)$

Q milieu [EH] on $E(1; 0; 1)$ et $H(0; 0; 1)$


donc $Q \left(\frac{1}{2}; 0; 1 \right)$ (écrire les formules).

2) $A(1; 0; 0)$ et $C(0; 1; 0)$, donc $\vec{AC} = \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \\ z_C - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - 1 = -1 \\ 1 - 0 = 1 \\ 0 - 0 = 0 \end{pmatrix}$

donc $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$D(0; 0; 0)$ et $G(0; 1; 1)$ donc $\vec{DG} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Exemple I, J, K, L, M, N, P et Q sont les milieux respectifs des arêtes [AB], [FG], [AE], [CG], [HG], [HD], [BF] et [EH].



Dans le repère de l'espace $(D; \vec{DA}; \vec{DC}; \vec{DH})$ déterminer :

- i) Les coordonnées des points I et Q
- ii) Les coordonnées des vecteurs $\vec{AC}; \vec{DG}$
- iii) Les coordonnées du centre Ω de la face BCGF
- iv) Donner les coordonnées du vecteur $\vec{u} = 2\vec{BH} - 3\vec{GD}$

exercice

A, B ou ex melle

est

$\frac{x}{2}$

propriet

remar

Exercice B (prou

Soit $A(2; 1; 5)$

(i) Montrer que

(ii) Montrer que

exercice

1) (AD) //

$\vec{AD} = \begin{pmatrix} - \\ - \\ - \end{pmatrix}$

iii) Ω est le pt d'intersection des diagonales du carré BCGF (3)
 on un carré a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, donc $\Omega = \text{milieu } [BG]$.

$$\Omega \left(\frac{1+0}{2}; \frac{1+1}{2}; \frac{0+1}{2} \right) \quad \Omega \left(\frac{1}{2}; 1; \frac{1}{2} \right)$$

iv) $\vec{u} = 2\vec{BH} - 3\vec{GD}$ $B(1, 1, 0); H(0, 0, 1); G(0, 1, 1); D(0, 0, 0)$

$$\vec{BH} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad 2\vec{BH} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{GD} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad -3\vec{GD} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

enfin $\vec{u} = 2\vec{BH} - 3\vec{GD}$ donc $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \vec{u} \begin{pmatrix} -2+0 \\ -2+3 \\ 2+3 \end{pmatrix}$

Exercices de base fondamentaux (à maîtriser)

On se place dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace.

Exercice a (déterminer si trois points sont alignés ou pas).

Les points $A(5; 2; 3), B(-1; 3; 2)$ et $C(-7; 4; 1)$ sont-ils alignés? Même question avec les points A, B et $D(1; 2; 3)$.

exercice a:

A, B et C alignés équivaut à dire que \vec{AB} et \vec{AC} sont colinéaires, ou encore à dire que \vec{AB} et \vec{AC} ont des coordonnées proportionnelles.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{AC} \begin{pmatrix} -12 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{donc } \vec{AC} = 2\vec{AB} \quad \text{donc } \vec{AB} \text{ et } \vec{AC} \text{ sont colinéaires et ont le pt } A \text{ en commun de les pt } A, B, C = \text{alignés}$$

testons si \vec{AB} et \vec{AD} sont colinéaires ou pas.

$$\vec{AD} \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{AB} \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{x_{AD}}{x_{AB}} = \frac{-4}{-6} = \frac{2}{3} \quad \frac{y_{AD}}{y_{AB}} = \frac{0}{1} = 0 \quad \text{or } \frac{2}{3} \neq 0 \quad \text{de coord. pas de } \vec{AB} \text{ et } \vec{AD}$$

proportionnelles, de \vec{AB} et \vec{AD} pas colinéaires, et pts A, B, D pas alignés.

remarque: A, B et D définissent le plan ABD car n alignés.

Exercice b (prouver que deux droites sont parallèles; prouver que deux droites sont sécantes).

Soit $A(2; 1; 5), B(4; 2; 4), C(3; 3; 5)$ et $D(0; 3; 7)$.

(i) Montrer que (AD) et (BC) sont parallèles.

(ii) Montrer que (AB) et (CD) sont sécantes.

exercice b:

1) $(AD) \parallel (BC)$ équivaut à dire: \vec{AD} et \vec{BC} colinéaires.

$$\vec{AD} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{de } \vec{AD} = 2\vec{BC} \quad \text{de } \vec{AD} \text{ et } \vec{BC} \text{ colinéaires de } (AD) \parallel (BC) \quad (AD) \text{ et } (BC) \text{ sont parallèles.}$$

2) (AB) et (CD) sont sécantes car 2 droites parallèles ont un même...

Exercice 1 (prouver que trois points forment un plan, montrer que 4 points sont coplanaires ou non coplanaires).

Soit $A(0; 1; -1)$, $B(2; 1; 0)$, $C(-3; -1; 1)$, $D(7; 3; -1)$ et $E(6; 1; 2)$.

(i) Démontrer que les points A, B et C forment un plan. (C'est une question très fréquente au bac...)

(ii) Déterminer les coordonnées du vecteur $2\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{AD}$. Qu'en déduit-on concernant les points A, B, C et D ?

(iii) Soit $F(18; 9; -6)$. Montrer que les points A, B, C et F sont coplanaires.

(iv) Soit $G(2; 7; 4)$. En raisonnant par l'absurde, montrer que les points A, B, C et G ne sont pas coplanaires.

exercice 2

* $\rightarrow \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ Δ pas 0 au dénominateur (4)

i) A, B, C forment un plan équivalent à dire que A, B et C ne sont pas alignés. Démontrons que A, B et C ne sont pas alignés. $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ * en prouvant que \vec{AB} et \vec{AC} sont pas colinéaires.


on $\frac{x \cdot \vec{AB}}{x \cdot \vec{AC}} = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$ et $\frac{y \cdot \vec{AB}}{y \cdot \vec{AC}} = \frac{0}{-2} = 0$ or $-\frac{2}{3} \neq 0$

de \vec{AB} et \vec{AC} m'ont pas leurs coord prop de \vec{AB} et \vec{AC} mon coin de A, B et C ne sont pas alignés, ils forment de un unique plan, le plan (ABC) .

ii) $\vec{u} = 2\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{AD}$ or $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ de $2\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$
 $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ de $-\vec{AC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ de $-\vec{AD} = \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

par suite $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ de $\vec{u} = \vec{0}$ et $2\vec{AB} - \vec{AC} - \vec{AD} = \vec{0}$

de $\vec{AD} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$ de \vec{AD} est une combinaison linéaire de \vec{AB} et \vec{AC}
 or A, B, C non alignés de \vec{AB} et \vec{AC} non colinéaires
 \rightarrow de \vec{AB}, \vec{AC} et \vec{AD} sont coplanaires et par suite les pts A, B, C et D sont coplanaires. ($D \in (ABC)$).



Comme A, B et C ne sont pas alignés, dire que A, B, C et F sont coplanaires revient à dire que $F \in (ABC)$ c'est que \vec{AF} est cbl de \vec{AB} et \vec{AC} : trouver les réels a et b tels que $\vec{AF} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$.

* $\vec{AF} = \begin{pmatrix} 18 \\ 9 \\ -6 \end{pmatrix}$ $\vec{AF} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$ avec $a\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2a \\ 0 \\ -a \end{pmatrix}$ et $b\vec{AC} = \begin{pmatrix} -3b \\ -2b \\ 2b \end{pmatrix}$
 $a\vec{AB} + b\vec{AC} = \begin{pmatrix} 2a-3b \\ -2b \\ a+2b \end{pmatrix}$

de vecteurs égaux ont les m[^] coord de $\vec{AF} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$
 on: $\begin{cases} 18 = 2a - 3b \\ 9 = -2b \\ -6 = a + 2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - 3b = 18 \\ b = -4 \\ a + 2b = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4 \\ 2a + 12 = 18 \\ a - 8 = -6 \end{cases}$

$\begin{cases} b = -4 \\ a = \frac{18 - 12}{2} \\ a = -5 + 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4 \\ a = 3 \\ a = 3 \end{cases} \rightarrow \text{est compatible.}$

or $\vec{AF} = 3\vec{AB} - 4\vec{AC}$ Par suite, A, B, C et F sont coplanaires.

iv) supposons par l'absurde que A, B, C et G soient coplanaires. Comme A, B, C ne sont pas alignés, il existerait des réels x et y tels que $\vec{AG} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$.

$$\vec{AG} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}; x\vec{AB} \begin{pmatrix} 2x \\ 0 \\ x \end{pmatrix} \text{ et } y\vec{AC} \begin{pmatrix} -3y \\ -2y \\ 2y \end{pmatrix}; x\vec{AB} + y\vec{AC} \begin{pmatrix} 2x-3y \\ -2y \\ x+2y \end{pmatrix}$$

Par suite: $\vec{AG} = x\vec{AB} + y\vec{AC} \iff \begin{cases} 2 = 2x - 3y \\ 6 = -2y \\ 5 = x + 2y \end{cases} \iff \begin{cases} 2x - 3y = 2 \\ y = -3 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$


$$\iff \begin{cases} 2x + 9 = 2 \\ y = -3 \\ x - 6 = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -3 \\ x = \frac{2-9}{2} \\ x - 6 = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -3 \\ x = -3,5 \\ x = 11 \end{cases}$$

de $-3, 5 = 11$: absurde, contradictoire!
 par suite l'hyp: A, B, C, G sont coplanaires conduit à une contradiction de cette hyp est fautive de A, B, C et G ne sont pas coplanaires!

IV- Position relative de deux droites de l'espace

Deux droites de l'espace sont soit coplanaires, c'est-à-dire qu'elles sont contenues dans un même plan, soit non coplanaires.

Si elles sont coplanaires, alors elles sont strictement parallèles, confondues ou sécantes.




Déterminer la position relative de deux droites de l'espace signifie déterminer dans lequel des cas de figures précédents on se trouve.

Si on définit chacune des droites par la donnée d'un point et d'un vecteur directeur, on a :

$d(A, \vec{u})$ et $d'(B, \vec{v})$ sont deux droites de l'espace.

- Si \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires alors (d) et (d') sont parallèles.
- Si \vec{u} et \vec{v} ne sont pas colinéaires, alors (d) et (d') sont sécantes lorsqu'elles ont un point en commun, non coplanaires sinon.



Remarques

Deux droites de l'espace sont confondues si et seulement si elles ont un point en commun et qu'elles sont parallèles.


Attention : Dans l'espace, deux droites qui n'ont aucun point en commun ne sont pas nécessairement parallèles : elles peuvent être non coplanaires !!!

V - Représentations paramétriques de droites de l'espace

Attention : on entre là dans le plus important du chapitre : vous verrez dans les exercices le nombre fréquent de question où l'on parle de représentation paramétrique de droites !!!!

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ un repère de l'espace.

Soit \mathcal{D} la droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et dont un vecteur directeur est $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ avec $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$.



Où que soit situé le point M sur la droite \mathcal{D} , les vecteurs \vec{AM} et \vec{u} sont colinéaires : traduisons cela :

$M(x; y; z) \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \vec{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ colinéaires} \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{il existe un} \\ \text{réel } t \text{ tel} \\ \text{que : } \vec{AM} = t\vec{u} \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$

En effet :

En réécrivant : $\begin{cases} x - x_A = at \\ y - y_A = bt \\ z - z_A = ct \end{cases}$ sous la forme : $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$, on obtient ce qu'on appellera une représentation paramétrique de la droite \mathcal{D} , passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et dirigée par $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Définition et propriété

Le système $(S) : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$ est appelé une représentation paramétrique de la droite \mathcal{D} , et le réel t est appelé le paramètre de cette représentation. On aurait pu utiliser pour le paramètre n'importe quelle lettre : t, t', s, u et v sont les plus fréquemment utilisées.

♥♥ La droite (\mathcal{D}) passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et dont un vecteur directeur est $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ avec $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$ est l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que : $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$ où $t \in \mathbb{R}$. ♥♥

Ce système est appelé une représentation paramétrique (notée R.P.) de la droite (\mathcal{D}) .

Il faut bien comprendre qu'à chaque valeur de t , on associe un point $M(x_A + at; y_A + bt; z_A + ct)$ et un seul, et que réciproquement, à chaque point M de (\mathcal{D}) correspond un unique réel t tel que $\vec{AM} = t\vec{u}$.

Conséquence : toute droite admet une infinité de représentations paramétriques, pourquoi? \textcircled{D}

Remarque : contrairement au plan, une seule équation ne suffit pas pour définir une droite de l'espace.

♥♥ Lorsqu'on a une représentation paramétrique d'une droite (\mathcal{D}) écrite sous la forme d'un système $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$, on peut affirmer, par simple lecture des coefficients du système, que (\mathcal{D}) passe par le

point $A(x_A; y_A; z_A)$ et que $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (\mathcal{D}) . ♥♥

Exemple 1

On donne la représentation paramétrique d'une droite (\mathcal{D}) de l'espace : $\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 + t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

- a) Définir la droite (\mathcal{D}) de deux manières différentes.
- b) Déterminer les coordonnées du point de paramètre -2 de (\mathcal{D}) . Le point $A(-10; -4; -16)$ appartient-il à (\mathcal{D}) ?

$$\vec{AM} = \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} = t \vec{u} = t \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$\vec{AM} = t\vec{u}$ se traduit par le fait que ces 2 vect ont les m^{em}e coord.

$$\text{dc } \begin{cases} x - x_A = at \\ y - y_A = bt \\ z - z_A = ct \end{cases}$$

en réécrivant :

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

\mathcal{D} passe par $A(1; 2; 3)$ et dirigée par $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$
 ~~$\vec{v} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ 10 \end{pmatrix}$ et ...~~

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} x = 1 + 8t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + 10t \end{cases}$$

\textcircled{D} car (\mathcal{D}) admet une ∞ de vecteurs directeurs

Si \vec{u} dirige \mathcal{D} alors $k\vec{u}$ si $k \in \mathbb{R}^*$ dirige aussi \mathcal{D} .

a) Par lecture de la R.P on a \mathcal{D} passe par $A(0, 1, -1)$ et est dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

• on donne les coord de 2 pts appartenant à \mathcal{D} .
 $\underbrace{A(0; 1; -1)}_{p \ t=0}$ et $\underbrace{B(2; 2; 2)}_{p \ t=1}$.

$$p \ t=1 : \begin{cases} x = 2 \times 1 = 2 \\ y = 1 + 1 = 2 \\ z = -1 + 3 \times 1 = 2 \end{cases}$$

de \mathcal{D} passe par $B(2; 2; 2)$.

$\mathcal{D} = (AB)$ si $A(0; 1; -1)$ et $B(2; 2; 2)$.

b) Soit M le pt de \mathcal{D} ayant p paramètre $t=2$.

$$\begin{cases} x = 2 \times (2) = 4 \\ y = 1 + 2 = 3 \\ z = -1 + 3 \times (2) = 5 \end{cases} \Rightarrow M(4; 3; 5)$$

c) $C(-10; -4; -16)$ on cherche ici s'il existe un réel t tel que :

$$\begin{cases} x_c = 2t \\ y_c = 1+t \\ z_c = -1+3t \end{cases} \text{ de } \begin{cases} -10 = 2t \\ -4 = 1+t \\ -16 = -1+3t \end{cases} \text{ de } \begin{cases} t = \frac{-10}{2} = -5 \\ t = -2 - 1 = -3 \\ t = \frac{-16+1}{3} = -5 \end{cases}$$


→ de ce pt $C(-10; -4; -16) \in \mathcal{D}$, C est le pt de paramètre $t=-5$ de \mathcal{D} .

Exemple 2

Donner deux représentations paramétriques de la droite (\mathcal{D}) , passant par $A(1; 0; -2)$ et par $B(1; -1)$.

Soit (T) la droite admettant pour R.P. : $\begin{cases} x = -1+t \\ y = 5-2t \\ z = 3-t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

Donner une R.P. de la droite (T') passant par A et parallèle à (T) .



a) Par lecture de la R.P. de (T)
 $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dirige (T) .

$(T') \parallel (T)$ de $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dirige également (T') .

Par suite (T') passe par $A(1; 0; -2)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dirige (T') de une R.P. de (T') : $\begin{cases} x = 1+t \\ y = -2t \\ z = -2-t \end{cases}$

i) \vec{AB} dirige \mathcal{D} avec $\vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

de une R.P. de \mathcal{D} est : $\begin{cases} x = 2+t \\ y = 1+t \\ z = -1+t \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = 1+2t \\ y = 2t \\ z = -2+2t \end{cases}$

\vec{AB} et \vec{AB} si $t \in \mathbb{R}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ dirige \mathcal{D} .

Exercice 8

Soit la droite (\mathcal{D}) , dont une R.P. est : $\begin{cases} x = -t+1 \\ y = 3t+1 \\ z = t+1 \end{cases}$ où $t \in \mathbb{R}$.

- a) Soient $E(1; 6; 0)$ et $F(3; 0; -2)$. (\mathcal{D}) et (EF) sont-elles parallèles ?
- b) Donner une R.P. de la droite (BC) .
- c) Soit $E(2; -3; 1)$ et $F(0; 3; 3)$. Démontrer que (\mathcal{D}) et (EF) sont strictement parallèles.

a) Par lecture de la R-P : $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ dirige \mathcal{D} .
de vecteur $\vec{BC} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}$ dirige (BC).

(BC) et \mathcal{D} ont // car \vec{u} et \vec{BC} sont colinéaires.
Grâce aux coordonnées on $\vec{BC} = -2\vec{u}$. de BC et \vec{u} sont colinéaires.
Par suite: (BC) // (\mathcal{D})

b) $B(1; 6; 0) \in (BC)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ dirige (BC) de une R-P de (BC).

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 6 + 3t \\ z = t \end{cases} \text{ si } t \in \mathbb{R}$$

c) $\vec{EF} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$ dirige (EF) et $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ dirige \mathcal{D}

on a $\vec{EF} = 2\vec{u}$ de EF et \vec{u} sont colinéaires de (\mathcal{D}) // (EF).
(strictement parallèle ou bien confondues).

Montrons enfin que \mathcal{D} et (EF) sont strictement // en établissant par exemple que $F(0; 3; 3)$ n'appartient pas à \mathcal{D} .

$$F(0; 3; 3) \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \text{ tel que } \begin{cases} x_F = -t + 1 \\ y_F = 3t + 1 \\ z_F = t + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = -t + 1 \\ 3 = 3t + 1 \\ 3 = t + 1 \end{cases}$$

Par suite: $F(0; 3; 3) \notin (\mathcal{D})$
or $F \in (EF)$ et (EF) // (\mathcal{D})
donc (\mathcal{D}) et (EF) sont strictement //.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{2}{3} \\ t = 2 \end{cases}$$

syst incompatible $1 \neq \frac{2}{3} \neq 2$

Exercice 7

1) Soit $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ un repère de l'espace.

(d) et (δ) les droites ayant pour représentation paramétrique respective :

$$(d): \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2-3t \\ z = 3-3t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad (\delta): \begin{cases} x = s \\ y = -3-3s \\ z = 1-s \end{cases} \text{ avec } s \in \mathbb{R}.$$

Etudier avec soin la position relative de (d) et (δ).

écartées
coplanaires
non coplanaires
conf. stricte-
//

2) Même question pour les droites (D) et (Δ) sachant que (D) passe par le point $A(2; -1; 1)$ et est dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, et que (Δ) admet pour R.P.: $\begin{cases} x = s+1 \\ y = 2s-3 \\ z = -s+2 \end{cases}$ avec $s \in \mathbb{R}$.

a) Par lecture des R-P
 $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix}$ dirige (d) et

$$\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ dirige } (\delta)$$

\vec{u} et \vec{v} ne sont pas col
car $\frac{DC \vec{u}}{\alpha \vec{v}} = 1$ et $\frac{DC \vec{u}}{\beta \vec{v}} = 3$ or $1 \neq 3$
 \Rightarrow de (d) et (δ) ne sont ni // ni confondues.

étudions l'intersection de (d) et (δ) : si $(d) \cap (\delta) \neq \emptyset$: droites non coplanaires et si $(d) \cap (\delta) = \emptyset$: les 2 droites sont sécantes.

$M(x; y; z) \in (d) \cap (\delta)$ car il existe des réels s et t tels que :

$$\begin{cases} x = 1+t = s \\ y = 2-3t = -3-3s \\ z = 3-3t = 1-s \end{cases}$$

on cherche s'il existe des réels t et s tels que :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1+t=d \\ 2-3t=-3-3d \\ 3-3t=1-d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=1+t \\ 2-3t=-3-3(1+t) \\ 3-3t=1-(1+t) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=1+t \\ 2-3t=-3-3-3t \\ 3-3t=1-1-t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d=1+t \\ 2=-6 \\ 3-3t=-t \end{cases} \Rightarrow (S) \text{ incompatible}$$

(D) \cap (S) = \emptyset (aucun pt en commun) et ne sont pas // de
(D) et (S) sont non coplanaires

2) (D) : passe par A(2; -1; 1) et est dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ de une RP de
(D) est :

$$\begin{cases} x=2+3t \\ y=-1-t \\ z=1+t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

Par lecture de la RP de (D), $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dirige (D).

\vec{u} et \vec{v} ne sont pas colinéaires car : $\frac{x\vec{u}}{x\vec{v}} = 3$ et $\frac{y\vec{u}}{y\vec{v}} = -\frac{1}{2} \neq 3$

donc (D) et (D) ne sont ni // ni confondues.

étude de l'intersection de (D) et (D) :

$$M(x, y, z) \in (D) \cap (D) \Leftrightarrow \exists (t; s) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } \begin{cases} x=2+3t=s+1 \\ y=-1-t=2s-3 \\ z=1+t=s+2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2+3t=s+1 \\ -1-t=2s-3 \\ 1+t=s+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s=1+3t \\ -1-t=2(1+3t)-3 \\ 1+t=-(1+3t)+2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s=1+3t \\ -1-t=-1+6t \\ 1+t=1-3t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s=1+3t \\ 7t=0 \\ 4t=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s=1 \\ t=0 \\ t=0 \end{cases} \quad \mathcal{P} = \{(0, 1)\}$$

et par suite $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \\ z=1 \end{cases}$ (D) et (D) ont sécantes en M(2; -1; 1)

Exercice 8

Déterminer si l'affirmation suivante est vraie ou fausse, en justifiant votre réponse :

Les droites (d) et (d') ont pour représentation paramétrique respective :

$$(d): \begin{cases} x=2+t \\ y=-1+3t \\ z=3-2t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad (d'): \begin{cases} x=-6-7t' \\ y=-25-21t' \\ z=19+14t' \end{cases} \text{ avec } t' \in \mathbb{R}.$$

Affirmation : (d) et (d') sont distinctes.

exo 3

par lecture des RP données

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ dirige } (d) \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -7 \\ -21 \\ 14 \end{pmatrix} \text{ dirige } (d')$$

Par suite: $\vec{v} = -7\vec{u}$ de \vec{v} et \vec{u} sont col de (d) et (d')
sont strictement // ou confondus

étude de l'orthogonalité de (d) et (d')

De plus, (d) passe par $A(2, -1, 3)$
de pt B appartient-il à (d') ?

$$A(2, -1, 3) \in (d') \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = -6 - 7t' \\ y_A = -25 - 21t' \\ z_A = 19 + 14t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = -6 - 7t' \\ -1 = -25 - 21t' \\ 3 = 19 + 14t' \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7t' = -8 \\ 21t' = -24 \\ 14t' = -16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t' = -\frac{8}{7} \\ t' = -\frac{24}{21} = -\frac{8}{7} \\ t' = -\frac{16}{14} = -\frac{8}{7} \end{cases} \Rightarrow (d) \text{ compatible}$$

de AC (d') , $A(2, -1, 3)$ est le pt de paramètre $t = -\frac{8}{7}$ de (d')

Par suite, (d) et (d') sont confondus de non distinctes \Rightarrow
affirmatif pour