

Chapitre 6

Les suites numériques

I – Introduction

Compléter, de façon logique, les listes de nombres suivantes :

- a) 1 ; 4 ; 7 ; 10
- b) 0,25 ; 1 ; 4
- c) 2 ; 1 ; - 1 ; - 5 ;
- d) 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8.....

I – Définitions et notations

- On appelle suite numérique, toute fonction définie sur \mathbb{N} (ou une partie de \mathbb{N}) et à valeurs réelles.

Notant U une telle fonction, on a :
$$U: \begin{array}{l} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n \rightarrow U(n) \end{array}$$

Par commodité, et surtout, pour la distinguer d'une fonction définie sur un intervalle de \mathbb{R} , on notera U_n [lire u indice n] à la place de $U(n)$.

- On a donc, par convention d'écriture, $\boxed{U_n = U(n)}$
- A présent, la suite $U: \begin{array}{l} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n \rightarrow U_n \end{array}$ sera notée $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou encore, (U_n) .
- Le nombre U_n est appelé le terme de rang n , ou encore le terme général de cette suite.

Associer aux énumérations des deux premiers exemples de l'introduction une suite sous forme de tableau :

Remarque : Pour une suite, parler de $U_{2,8}$ n'a aucun sens.

- ♥ Si elle est définie sur \mathbb{N} , U_0 est appelé le premier terme de la suite (U_n) .
- ♥ Si elle est définie pour tout entier naturel n non nul, U_1 est le premier terme de la suite (U_n) .

Exemple 1


1) Soit (U_n) la suite définie pour tout entier naturel n , par : $U_n = 2n + 4$.

Calculer U_0 ; U_1 ; U_2

2) Exprimer U_{n+1} en fonction de n .

3) Soit (V_n) la suite définie par : $V_n = \frac{1}{n}$. Sur quel ensemble cette suite est-elle définie ? Combien vaut son premier terme ? Comment le notez-vous ?


Une suite (u_n) peut être représentée graphiquement par un nuage de points A_n de coordonnées $(n ; u_n)$ où n est entier naturel (éventuellement non nul) :



EXEMPLE : La représentation graphique ci-contre est celle des premiers termes de la suite (u_n) , définie pour tout entier naturel n par $u_n = -n^2 + 6n - 1$. Comme $u_0 = -1, u_1 = 4, u_2 = 7, u_3 = 8, u_4 = 7, \dots$, on obtient les points $A_0(0; -1), A_1(1; 4), A_2(2; 7), A_3(3; 8), A_4(4; 7)$.


Exemple 2

(u_n) est définie par $u_n = \frac{1}{n}$,
pour tout entier $n \geq 1$.



Exemple 3

(v_n) est définie par $v_n = \frac{4n-5}{2n+3}$,
pour tout entier naturel n .



2- Suites définies explicitement

Lorsque l'on connaît l'expression $U_n = f(n)$, où f est une fonction donnée, on dira que la suite (U_n) est définie explicitement.

Cela signifie, que l'on peut calculer d'un seul coup, pour n'importe laquelle des valeurs de l'entier n , la valeur de U_n .

Exemple 1

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n , par : $u_n = 2n^2 + n + 3$.

- 1) Calculer les trois premiers termes de cette suite.
- 2) Calculer le terme de rang 6 de cette suite, puis le dixième terme de cette suite.
- 3) Exprimer u_{n+1} en fonction de n . Même question pour $u_n + 1$. A-t-on $u_{n+1} = u_n + 1$?
- 4) Exprimer u_{2n} en fonction de n .

✂ -----

Exemple 2

Calculer les trois premiers termes de la suite (v_n) définie pour tout entier $n \geq 2$ par : $v_n = \sqrt{n-2}$.

Voici une fonction Python qui permet de calculer u_n pour l'entier n de votre choix, lorsque (u_n) est définie par : $u_n = n^3 - 4n^2 + n - 1$.

```
def u(n):
    return n**3-4*n**2+n-1
```

En tapant dans la console : $u(3)$ on obtient le terme $u_3 = \dots$

Voici un tutoriel (à **travailler seul** et à maîtriser) pour calculer sur sa calculatrice *TI* et faire apparaître sous forme d'une table, les termes d'une suite définie explicitement :

<https://www.youtube.com/watch?v=bvXdeTRQrD0>

Faire une table de valeurs de la suite précédente sur sa TI.

3 – Suites définies par une relation de récurrence

On peut aussi générer une suite en calculant ses termes de proche en proche, c'est-à-dire la définir par la donnée de son premier terme, et par une relation de récurrence, c'est-à-dire une égalité reliant deux termes consécutifs quelconques de cette suite :

Exemple

Soit (U_n) la suite définie par : $U_0 = 4$, et pour tout entier naturel n , $U_{n+1} = 3U_n - 1$.

Calculer U_1 , U_2 , U_3 . Comprenez-vous la terminologie de proche en proche ou encore, par récurrence ?

Remarques : Dans l'exemple précédent, est-il aisé de calculer U_{2023} ? Pourquoi?


U_{n+1} est appelé le terme successeur au terme U_n .

Exercice 1

1a) Définir de façon explicite la suite des entiers naturels pairs, puis définir cette même suite par une relation de récurrence.

1b) Définir la suite correspondant à l'énumération : 0,25 ; 1 ; 4 ; 16 ; 64.....par son premier terme et une relation de récurrence.

2) Soit n un entier naturel non nul, et u_n le nombre de points composant le motif triangulaire à l'étape n :



Définir la suite (u_n) par son premier terme et une relation de récurrence.

3) Soit (v_n) la suite définie par : $v_0 = \frac{3}{2}$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 2v_n(1 - v_n) + 2$.

Calculer v_2 .

4) Chaque année, une ruche perd 40 % de ses abeilles, et l'apiculteur remet 10000 nouvelles abeilles dans la ruche chaque année.

En 2022, la ruche contenait 50000 abeilles. On note u_n le nombre d'abeilles en l'année 2022 + n .

a) Combien vaut u_0 ?

b) Calculer la valeur exacte de u_1 .

c) Déterminer une relation de récurrence entre u_n et u_{n+1} .

✂ -----

Exercice 2

1) Calculer sous forme de fraction irréductible les quatre premiers termes de la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n + 1} \end{cases}$$

2) Même question avec la suite (v_n) définie par :

$v_0 = 4$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = v_n - n + 4$.

Voici un tutoriel (à travailler seul et à maîtriser) pour calculer sur sa calculatrice TI et faire apparaître sous forme d'une table, les termes d'une suite définie par une relation de récurrence :

https://www.youtube.com/watch?v=D5OAI2_h_bw

Retrouver les résultats de la question 1) de l'exercice ci-dessus.

Calcul des termes d'une suite récurrente à l'aide d'un algorithme

Considérons la suite (u_n) définie par : $u_0 = 1$, et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

En utilisant une boucle Pour, cela se fait sans problème :

En pseudo code :

Une fois l'entier N choisi par l'utilisateur :

```

U ← 1
Pour K variant de 1 à N,
  U ← 2U + 3
Fin
Afficher U

```

La variable K est un compteur de boucle : on demande à la machine de répéter N fois une même instruction, ici remplacer la valeur stockée dans U par $2U + 3$.

Comme $U = 1$ au départ correspond à la valeur de $u_0 = 1$ de la suite (u_n) , après N itérations (= répétitions) de l'instruction, on obtient en sortie la valeur u_N cherchée.

Avec Python :

```

def u(n):
    u=1
    for k in range (n):
        u=2*u+3
    return u

```

ou encore

```

def u(n):
    u=1
    for k in range(1,n+1):
        u=2*u+3
    return u

```

Remarque :

L'instruction : ***for k in range (n)*** signifie que l'entier k vérifie la condition : $0 \leq k < n$, et prend successivement les valeurs $0 ; 1 ; \dots$ et pour dernière valeur $n - 1$.

Attention dans l'inégalité : $0 \leq k < n$, la valeur n est exclue !

On utilise encore plus fréquemment l'instruction : ***for k in range (0, n)*** qui signifie que l'entier k vérifie la double inégalité : $0 \leq k < n$.

Pour afficher tous les termes jusqu'à celui de rang n d'une suite, on utilise des listes :

Par exemple, considérons la suite définie par :

$u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n^2 - 5$.

L'algorithme ci-dessous, à retenir, génère en sortie les termes : u_0, u_1, \dots, u_n où n est choisi par l'utilisateur.

En pseudo code :

$A \leftarrow 0$ > Initialement A prend la valeur 0 car $u_0 = 0$.
 $L \leftarrow [A]$ > Au départ, la liste L contient seulement l'élément u_0 .
 Pour k variant de 1 à n > On répète n fois une même instruction
 $A \leftarrow A^2 - 5$ > On calcule un terme à partir du précédent contenu dans A
 $L \leftarrow L + [A]$ > Le terme calculé à l'étape précédente est inséré dans la liste L .
 Fin de pour
 Retourner L > En fin du programme, L contient **tous** les termes de la suite, **de u_0 à u_n** .

En Python :

```

def termes_u(n):
    A=0
    L=[A]
    for k in range (n):
        A=A*A-5
        L=L+[A]
    return(L)

```

ou encore :

```

def termes_u(n):
    A=0
    L=[A]
    for k in range (1,n+1):
        A=A*A-5
        L=L+[A]
    return(L)

```

Exemple

Dans l'algorithme ci-dessous, on note u_n la dernière valeur de la liste obtenue.

$A \leftarrow -1$
 $L \leftarrow [A]$
 Pour k variant de 1 à n
 $A \leftarrow 2A + 3$
 $L \leftarrow L + [A]$
 Fin de pour
 Retourner L

- L'utilisateur choisit $n = 2$. Déterminer le contenu de la liste L en sortie de programme.
- Quel est le rôle de cet algorithme vis-à-vis d'une suite à définir ?

✂

II – Sens de variation d'une suite

Définition (fondamentale, à mémoriser par cœur).

- ♥ Une suite (U_n) définie sur \mathbb{N} est dite croissante lorsque pour tout entier naturel n , on a : $U_{n+1} \dots U_n$ ♥
- ♥ Une suite (U_n) définie sur \mathbb{N} est dite décroissante lorsque pour tout entier naturel n , on a : $U_{n+1} \dots U_n$ ♥
- ♥ Une suite (U_n) définie sur \mathbb{N} est dite constante lorsque pour tout entier naturel n , on a : $U_{n+1} \dots U_n$ ♥

Remarques

On dira qu'une suite est monotone, dès lors qu'elle est croissante ou décroissante.

Une suite est dite strictement croissante (respectivement strictement décroissante) lorsque pour tout entier naturel n , on a : $U_{n+1} > U_n$, (respectivement $U_{n+1} < U_n$).

Exemple d'illustration

Tracez quatre nuages de points associés respectivement à :

a) Une suite croissante


b) Une suite décroissante

c) Une suite strictement croissante

d) Une suite strictement décroissante

Remarque

Le nuage de point ci-dessous est associé au pourcentage de bactérie dans le sang d'un animal. On note (B_n) la suite des taux observés durant les dix premières heures.



La suite (B_n) est-elle monotone ? A partir de quel rang *noté* p la suite (B_n) est-elle monotone ?

On peut donc dire qu'une suite numérique (u_n) est croissante à partir du rang p , où $p \in \mathbb{N}$, si :

.....

Une suite numérique (u_n) est décroissante à partir du rang p , où $p \in \mathbb{N}$, si :


.....

Attention : pour une suite, ne pas être croissante ne signifie pas être décroissante !

Contre-exemple :

Exercice 3

On a représenté graphiquement ci-dessous les courbes de deux fonctions f et g .



Conjecturer graphiquement le sens de variation des suites (u_n) et (v_n) définies par $u_n = f(n)$ et $v_n = g(n)$ pour tout entier naturel n .

Des méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite :

A – Méthode de la différence (la plus fréquemment utilisée)

Au vu de la définition précédente, et en se souvenant que pour des réels A et B , dire que $A \geq B$ équivaut à dire que $A - B \geq 0$, on a :

- Si pour tout entier naturel n , $U_{n+1} - U_n \geq \dots$, alors (U_n) est
- Si pour tout entier naturel n , $U_{n+1} - U_n \leq \dots$, alors (U_n) est

Ainsi, pour étudier le sens de variation d'une suite (u_n) , on pourra étudier le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$, en laissant n entier quelconque.

Exemples importants

- 1) Etudier le sens de variation de la suite (U_n) définie pour tout entier naturel n par : $U_n = n^2 - 2n + 5$
 - 2) Etudier le sens de variation de la suite (V_n) définie pour tout entier naturel n par : $V_n = \frac{2n+5}{n+2}$
 - 3) Etudier le sens de variation de la suite (W_n) définie par :
 $W_0 = 4$, et pour tout entier naturel n , $W_{n+1} = W_n - 2$
 - 4) Etudier le sens de variation de la suite (Z_n) définie pour tout entier naturel n non nul par :
 $Z_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.
 - 5) Etudier le sens de variation de la suite (X_n) où $X_n = (n - 5)^2$, $n \geq 5$
 - 6) (u_n) est définie par : $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + n^2 - 10$.
A partir de quel rang cette suite est-elle croissante ?
 - 7) Une entreprise a modélisé ses émissions, en tonnes de CO_2 , en l'année $2020 + n$ où n est entier naturel, par la suite (u_n) définie par : pour tout entier naturel n , $u_n = 40000 \times 0,89^n + 13000$.
 - 0) Que représente concrètement u_0 ?
 - a) Exprimer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n .
 - b) En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .
 - c) Comment interpréter ce résultat dans le cadre de la situation ici étudiée ?
- ✂ -----

B – Méthode des quotients pour les suites à valeurs positives

Si pour tout entier naturel n , $u_n > 0$, on peut aussi comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 :

En effet :

Si pour tout entier naturel : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \dots\dots\dots$, alors la suite (u_n) est

Si pour tout entier naturel : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \dots\dots\dots$, alors la suite (u_n) est

🔥🔥 **La méthode des quotients** n'est applicable qu'à des suites dont **tous les termes sont strictement positifs**. Il vous faudra systématiquement, si vous voulez utiliser cette méthode, vérifier ce dernier point !

Exercice 4

Etudier le sens de variation de chacune des suites suivantes :

a) $u_n = \frac{2^{3n}}{3^{2n}}$

b) $v_n = 4 \times 0,5^n$

✂ -----

III – Les suites arithmétiques

a) Définition des suites arithmétiques par une relation de récurrence

Définition : Une suite (U_n) est arithmétique, s'il existe un réel R appelé la raison de la suite, tel que :

Pour tout entier naturel n ,

Remarque : Cela ne fait que traduire le fait que pour les suites arithmétiques, on passe d'un terme quelconque à son terme successeur, en ajoutant à chaque fois le même nombre R appelé raison de la suite.

Les termes consécutifs d'une suite arithmétique sont régulièrement espacés de R en R :

Illustration :

Pour être encore plus terre à terre, quand vous comptez par exemple de 3 en 3, vous générez une suite arithmétique de raison $R = 3$.

Par exemple, si je commence avec le nombre 1, je vais dire : 1 ; 4 ; 7 ; 10.....

Modéliser cette énumération par une suite à définir :

Exemple 1 : Etablir que la suite des entiers naturels impairs est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme ainsi que la raison.

Exemple 2 : Soit (U_n) la suite définie sur \mathbb{N} par $U_n = 2n + 5$. Démontrer que cette suite est arithmétique, et préciser sa raison.

Méthode :

Exemple 3 : Soit (U_n) la suite définie sur \mathbb{N} par $U_n = n^2$. Cette suite est-elle arithmétique ? Justifier.

Exemple 4 : Soit (U_n) une suite arithmétique de raison R . Etudier son sens de variation.

✂ -----

b) Expression explicite des suites arithmétiques

Propriété (expression explicite dans le cas d'une suite arithmétique)

♥♥♥♥

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison R et de premier terme u_0 .

Pour tout entier naturel n , on a ♥ : $u_n = \dots\dots\dots$ (expression explicite de u_n en fonction de n).

De même, pour tout entier naturel p et tout entier naturel $n \geq p$, on a : $u_n = \dots\dots\dots$

En particulier, si (u_n) est définie à partir du rang 1, on a : ♥

Preuve :

La suite arithmétique (u_n) de raison r et de premier terme u_0 vérifie la relation

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

En calculant les premiers termes :

$$u_1 = u_0 + r$$

$$u_2 = u_1 + r$$

$$u_3 = u_2 + r$$

...

$$u_n = u_{n-1} + r$$

En additionnant membre à membre ces n égalités, on obtient :

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + n \times r$$

Soit, en retranchant aux deux membres les termes identiques :

$$u_n = u_0 + nr$$

Exercice 5

1a) Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $R = 3$. Déterminer l'expression générale de u_n en fonction de n , où n est entier naturel quelconque.

1b) En déduire le quinzième terme de la suite (u_n) .

✂ -----

Exercice 6

1a) Soit (u_n) la suite arithmétique telle que : $u_5 = 7$ et $u_{16} = 40$. Déterminer la raison et le premier terme u_0 de cette suite (u_n) .

1b) En déduire l'expression générale de u_n en fonction de n .

Exercice 7 (fondamental)

Soit (U_n) la suite à valeurs strictement positives définie par : $U_0 = 1$, et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$U_{n+1} = \frac{U_n}{U_n + 1}.$$

Soit enfin la suite (V_n) définie pour tout entier naturel n par : $V_n = \frac{1}{U_n}$


- 1) Calculer U_1, U_2, U_3 et U_4 . En déduire que (U_n) n'est pas une suite arithmétique.
- 2) Calculer les cinq premiers termes de la suite (V_n) . Conjecture sur la suite (V_n) ?
- 3) Démontrer que la suite (V_n) est arithmétique, préciser sa raison.
- 4) En déduire l'expression de V_n en fonction de n , puis celle de U_n en fonction de n .

✂

Exercice 8

La figure ci-dessous, indique le début de la construction de zones colorées que l'on peut prolonger indéfiniment. Tous les triangles de la figure sont équilatéraux.

Prouver que la suite (u_n) des aires définies par la figure est arithmétique. Quelle est sa raison ?



On rappelle que la hauteur d'un triangle équilatéral de côté a vaut : $h = \frac{\sqrt{3} a}{2}$

✂

Les suites arithmétiques sont donc à rapprocher de quel type de fonction ? Pourquoi ?


Propriété

Lorsqu'on a une suite arithmétique (u_n) , pour tout entier naturel n , les points $A_n(n ; u_n)$ sont alignés.

Preuve :

Exemple

On a représenté ci-dessous les premiers points du nuage de points associé à la suite (u_n) arithmétique de raison $R = \dots$ et de premier terme $u_0 = 4$.

c) Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétiqueIntroduction :

Carl-Friedrich Gauss était un élève très doué en mathématiques qui s'ennuyait un peu au cours de calcul en première année scolaire. Un jour, lorsqu'il dérangeait trop le cours, le maître lui donna comme punition de calculer la somme des 100 premiers nombres. Gauss y réfléchit un court instant et répondit 5050. Le maître le regardait tout étonné, se mit à vérifier le calcul et resta bouche bée.

"Mais comment as-tu fait pour trouver ce résultat aussi vite?" lui demanda-t-il après un moment.

Nous allons essayer de comprendre l'astuce utilisée par le jeune Gauss :

C'est ce résultat que nous allons généraliser :

Propriété

Pour tout entier naturel n non nul on a : $1+2+\dots+n =$


La somme $1+2+\dots+n$ se note rigoureusement : $\sum_{k=1}^n k$

Ainsi, $\sum_{k=1}^n k = \dots\dots\dots$

Preuve :

Exercice 9

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, T_n désigne le nombre de points sur le $n^{\text{ième}}$ dessin :



Exprimer T_n en fonction de n .

✂ -----

Exercice 10

- a) Calculer la somme de tous les multiples de 5 inférieurs à 999.
- b) Calculer astucieusement la somme : $S = 33 + 36 + 39 + \dots + 273$.

✂ -----

Propriété (somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique)

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison R .

Notons, pour tout entier naturel n , S la somme définie par : $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k$

On a : $S = \dots = \heartsuit \heartsuit \dots \heartsuit \heartsuit$

Plus généralement, pour tout entier $p \leq n$ on a :

$u_p + \dots + u_n = \dots = \heartsuit \heartsuit \dots \heartsuit \heartsuit$

Preuve :

Exercice 11

Calculer la somme des entiers naturels impairs inférieurs à 100.

Exercice 12

Une entreprise estime le coût d'un forage ainsi :

- le premier mètre coûte 1 000 euros.
- Le second mètre coûte 1 050 euros et chaque mètre supplémentaire coûte 50 euros de plus que le précédent.
- On dispose d'un crédit de 519 750 €.

On appelle (u_n) la suite telle que $u_1 = 1\,000$ et u_n représente de coût du n^{e} mètre.

- Montrer que (u_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison. Exprimer alors u_n en fonction de n .
- Montrer que le nombre de mètres n que l'on peut forer avec le crédit alloué vérifie :

$$n^2 + 39n - 20\,790 = 0$$
- En déduire la profondeur du forage que l'on peut creuser avec le crédit dont on dispose.

✂ -----

IV- Les suites géométriques**a) Définition des suites géométriques par une relation de récurrence**

Définition : Une suite (U_n) est géométrique, s'il existe un réel noté Q , et appelé la raison de la suite, tel que :

Pour tout entier naturel n , $\boxed{U_{n+1} = \dots\dots\dots}$

Remarque 1 : Les cas où $Q = 0$ ou $Q = 1$ n'ont pas un grand intérêt. Pourquoi ?

Remarque 2 : Cela ne fait que traduire le fait que pour les suites géométriques, on passe d'un terme à son successeur en multipliant à chaque fois le même nombre Q appelé raison de la suite.

Pour être encore plus terre à terre, n'avez-vous jamais joué à ce jeu qui consiste à doubler le résultat précédent ?

Quand vous comptez comme précédemment, vous générez une suite géométrique de raison $Q = 2$.

Par exemple, si je commence avec le nombre 1, je vais dire : 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16.....

Modéliser cette énumération par une suite à définir.

Exemple : Soit (U_n) la suite définie sur \mathbb{N} par : $U_n = \frac{2^n}{9}$

Montrer que cette suite est géométrique, préciser sa raison Q ainsi que son premier terme.

✂ -----

Remarque : si (u_n) est une suite géométrique de raison Q telle que pour tout entier naturel n , $u_n \neq 0$, alors, pour tout entier naturel n , $Q = \dots\dots\dots$

Cela donne une méthode pour calculer Q , à condition de vérifier au préalable que tous les termes de la suite (u_n) sont non nuls !

Exemple

Démontrer que la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par : $u_n = 2 \times 3^{2n+4}$ est géométrique et préciser sa raison.

✂ -----

b) Expression explicite des suites géométriques

Propriété (expression de U_n en fonction de n , lorsque (U_n) est une suite géométrique).

Soit (U_n) une suite géométrique de raison Q , et de premier terme U_0 .

Alors, pour tout entier naturel n , on a : ♥♥♥♥ $U_n = \dots\dots\dots$ ♥♥♥♥

Plus généralement, pour tout entier naturel p et tout entier naturel n , on a : $U_n = \dots\dots\dots$

En particulier, dans le cas où une suite géométrique (V_n) a pour premier terme V_1 et raison Q , on a pour tout entier $n \geq 1$: ♥♥♥♥ $V_n = \dots\dots\dots$ ♥♥♥♥

Cette propriété permet donc de calculer de façon explicite tous les termes d'une suite géométrique.

Nous verrons dans le prochain chapitre que si (u_n) est géométrique, alors $u_n = f(n)$ où f est une fonction de type exponentielle.

Preuve :

Exemple 1

Soit (U_n) la suite géométrique de raison $Q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $U_0 = 3$.

- Exprimer, pour tout entier naturel n , U_n en fonction de n .
- En déduire U_{12} .

✂ -----

Exemple 2

Exemple : Soit une suite (u_n) géométrique de raison q . On donne : $u_7 = 4\,374$ et $u_5 = 486$. Trouver la raison q , le premier terme u_0 et u_{10} sachant que la raison est positive.

✂ -----

Exemple 3

La production de blé (en tonne) d'un pays croit de 2 % chaque année.

En 2020 ce pays produisait 200000 tonnes de blé.

On note u_n la masse en tonnes de blé produite par ce pays en l'an 2020 + n où n est un entier naturel.

- Calculer u_1 .
- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- En déduire l'expression de u_n en fonction de n .

Reprendre les questions précédentes avec le modèle d'évolution suivant : baisse de 5 % de la production par an à partir de l'an 2021 sachant qu'en 2020 le pays produisait 200000 tonnes de blé.

✂ -----

Exemple 4

Soit (u_n) une suite telle que pour tout entier naturel n , $u_n \neq 0$.

On suppose que le taux d'évolution d'un terme quelconque au suivant est constant et égal à un réel k donné.

Que peut-on dire de la suite (u_n) ?

✂ -----

Exemple 5

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $Q > 0$. Etudier son sens de variation en fonction de la valeur de son premier terme u_0 .

✂ -----

Exemple 6**MATHS & PHYSIQUE**

Au niveau de la mer (altitude 0), la pression atmosphérique est de 1 013 hectopascals.

On suppose que la pression atmosphérique diminue de 1,25 % à chaque élévation de 100 m.

On note p_n la pression atmosphérique en hectopascals à l'altitude $100n$ en mètres. On a donc $p_0 = 1 013$. On arrondira tous les résultats à l'unité.

- Calculer les pressions p_1 et p_2 aux altitudes 100 et 200 m.
- Écrire p_{n+1} en fonction de p_n pour tout entier naturel n .
Que peut-on en déduire sur la suite (p_n) ?
- Exprimer p_n en fonction de n .
- Calculer la pression atmosphérique à l'altitude 3 200 m.

✂ -----

Exercice 13

Soit (U_n) la suite définie par : $U_0 = 65$, et pour tout entier naturel n , $U_{n+1} = 0,8U_n + 18$.

1) Calculer U_1 puis U_2 .

2) Soit (V_n) la suite définie pour tout entier naturel n , par $V_n = U_n - 90$.

Calculer V_0 , puis prouver que (V_n) est une suite géométrique de raison 0,8.

3) Exprimer V_n en fonction de n , puis en déduire l'expression de U_n en fonction de n .

4) En s'aidant d'une calculatrice, prévoir le comportement des valeurs prises par cette suite lorsque n devient grand ($n = 50$ puis $n = 100$ puis $n = 200$ etc.).

c) Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Propriété phare

Soit q un réel quelconque et n un entier naturel.

Notons S la somme : $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \sum_{k=0}^n q^k$

Si $q \neq 1$ on a : $S = \dots\dots\dots$

Si $q = 1$ on a : $S = \dots\dots\dots$

Preuve :

Exemple : La légende raconte qu'un roi de Perse voulu récompenser l'inventeur du jeu d'échecs. Après avoir réfléchi, ce dernier lui proposa "Vous déposerez un grain de riz sur la première case, puis deux sur la deuxième, puis quatre sur la troisième, vous doublez ainsi le nombre de grains en passant d'une case à l'autre jusqu'à la 64ème et je vous prends tous les grains". "Ce n'est pas une grosse récompense" lui répondit le roi". Qu'en pensez-vous? Quelle masse de blé cela représente-t-il?

On admettra qu'en moyenne un grain de riz a une masse de 0,04 gramme, et on prendra comme approximation du nombre 2^{10} la valeur 1000. ($2^{10} = 1024$).

Comparer à la production mondiale de blé en 2019 qui était de 513 millions de tonnes.

On commencera par exprimer le nombre de grains de riz sur la i ème case, pour tout entier i valant successivement : 1 ; 2 ; ; i ; ; 64.

✂ -----

Propriété (somme des termes d'une suite géométrique).

Soit (U_n) une suite géométrique de raison $Q \neq 1$, et de premier terme U_0 .

Alors : $S = U_0 + U_1 + \dots\dots\dots + U_n = \dots\dots\dots = \heartsuit\heartsuit\heartsuit\heartsuit\dots\dots\dots\heartsuit\heartsuit\heartsuit\heartsuit$

Retenir SURTOUT ce qui est écrit après le dernier signe = de la propriété encadrée

Preuve :

Exercice 14

Calculer $S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{16}$ puis $S' = \sum_{k=0}^{15} 3 \times 2^{-k}$.

✂ -----

Exercice 15

Une maison est louée depuis exactement 10 années par un même locataire. La première année, le loyer mensuel s'élevait à 900€. Puis chaque année, ce montant a augmenté de 1 % par rapport à l'année précédente.

- a) On note u_n le loyer au bout de n années de location. Exprimer u_n en fonction de n .
- b) Calculer la somme totale (au centime d'euro près) dépensée par le locataire au cours de ces 10 années.

✂ -----

V- Notion intuitive de limite de suite**a) Suite admettant une limite finie**

Considérons la suite (u_n) définie sur \mathbb{N}^* par : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{1}{n}$.

Regardons, grâce au tableau ci-dessous, le comportement des valeurs prises par cette suite (u_n) lorsque n devient très grand :

n	1	10	100	1000	10000	10^6	10^9
u_n							

Quel constat faites-vous ?

On dira que : la suite (u_n) converge vers ..., c'est-à-dire que lorsque n devient "très grand", les valeurs prises par cette suite se rapprochent de

On dira que la limite de cette suite vaut ..., ce que l'on notera :

Fixez bien cette notation qui sera d'usage quotidien en terminale.

Définition plus rigoureuse de la limite d'une suite

Soit (u_n) une suite, et L un nombre réel fixé.

On dit que la suite (u_n) converge vers L si et seulement si, à partir d'un certain rang de l'entier n , tous les termes u_n sont aussi proches de L que l'on veut.

Dans un tel cas, on dira que la suite (u_n) est convergente, et quelle converge vers L . On notera cela :

Illustration graphique de la notion de convergence d'une suite :

Exercice 16

A l'aide de votre calculatrice, déterminer la limite de chacune des suites suivantes définies par :

$$u_n = 2 + \frac{1}{n^2+1} \quad ; \quad v_n = 5 + 0,2^n.$$

✂ -----

Exercice 17

On lance à volonté un dé cubique non truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

Soit n le nombre de lancers effectués, et u_n la probabilité de l'événement E_n :

E_n : "obtenir au moins un six au cours des n lancers".

Montrer que $u_n = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$, puis déterminer la limite de la suite (u_n) et interpréter ce résultat dans le cadre de ce jeu.

✂ -----

b) Suite admettant une limite infinie

Considérons la suite (u_n) définie par : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n$.

Regardons, grâce au tableau ci-dessous, le comportement des valeurs prises par cette suite (u_n) lorsque n devient très grand :

n	1	10	100	200	300
u_n					

Quel constat faites-vous ?

On dira que : la suite (u_n) diverge vers ..., c'est-à-dire que lorsque n devient "très grand", les valeurs prises par cette suite finissent par dépasser la valeur de n'importe quel réel A arbitrairement fixé, aussi grand que soit A !

On notera :

Exemple 2

Considérons l'algorithme suivant écrit en pseudo code.

```

//-----//
U ← 100
N ← 0
Tant que U ≥ 20
  U ← 0,5U
  N ← N + 1
Fin de tant que
Afficher N
//-----//

```

a) Déterminer à la main la valeur affichée par ce programme, puis interpréter cette dernière vis-à-vis d'une suite (u_n) que l'on définira.

b) Le coder en Python.

c) On admet que la suite (u_n) précédemment définie converge vers 0 et qu'elle décroît.

Soit A un réel strictement positif. Modifier l'algorithme initial, et celui en python pour qu'il affiche en sortie le rang à partir duquel $u_n < A$ pour la première fois.

✂ -----

Exemple 3

Soit (u_n) la suite définie par : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 \times 1,25^n$.

On admet que la suite (u_n) diverge vers $+\infty$, et donc, que les valeurs prises par cette suite finissent par dépasser n'importe quel réel A fixé (aussi grand soit-il), on parle de franchir le seuil A .

Compléter l'algorithme suivant qui cherche la valeur du plus petit entier naturel N tel que $u_N \geq A$, où A est un réel positif choisi par l'utilisateur, et qui affiche en sortie cet entier N ainsi que le terme u_N correspondant :

```

def seuil(A):
    n=0
    u=3
    while u.....:
        n=.....
        u=.....
    return ...

```

VII- Des exercices de baccalauréat !

Exercice 1

En traversant une plaque de verre teintée, un rayon lumineux perd 20 % de son intensité lumineuse. L'intensité lumineuse est exprimée en candela (cd).

On utilise une lampe torche qui émet un rayon d'intensité lumineuse réglée à 400 cd.

On superpose n plaques de verres identiques (n étant un entier naturel) et on désire mesurer l'intensité lumineuse I_n du rayon à la sortie de la n -ième plaque.

On note $I_0 = 400$ l'intensité lumineuse du rayon émis par la lampe torche avant de traverser les plaques (intensité lumineuse initiale). Ainsi, cette situation est modélisée par la suite (I_n) .

1. Montrer par un calcul que $I_1 = 320$.
2.
 - a. Pour tout entier naturel n , exprimer I_{n+1} en fonction de I_n .
 - b. En déduire la nature de la suite (I_n) . Préciser sa raison et son premier terme.
 - c. Pour tout entier naturel n , exprimer I_n en fonction de n .
3. On souhaite déterminer le nombre minimal n de plaques à superposer afin que le rayon initial ait perdu au moins 70 % de son intensité lumineuse initiale après sa traversée des plaques.
 - a. Afin de déterminer le nombre de plaques à superposer, on considère la fonction Python suivante.

```
def nombrePlaques(J):
    I=400
    n=0
    while I > J:
        I = 0.8*I
        n = n+1
    return n
```

Préciser, en justifiant, le nombre j de sorte que l'appel `nombrePlaques(j)` renvoie le nombre de plaques à superposer.

- b. Le tableau suivant donne des valeurs de I_n . Combien de plaques doit-on superposer ?

n	0	1	2	3	4	5	6	7
I_n	400	320	256	204,8	163,84	131,07	104,85	83,886

Exercice 2

Les résultats seront arrondis à l'unité.

La quantité (en kg) de déchets ménagers produite par habitant d'une ville de taille moyenne a été de 537 kg en 2019 et la municipalité espère réduire ensuite cette production de 1,5 % par an.

Pour tout entier naturel n , on note d_n la quantité (en kg) de déchets ménagers produit par habitant de cette ville durant l'année 2019 + n , on a donc $d_0 = 537$.

1. Montrer par un calcul que $d_1 = 0,985 \times d_0$
2. Pour tout entier naturel n , exprimer d_{n+1} en fonction de d_n .
3. En déduire la nature de la suite (d_n) puis une expression de d_n en fonction de n .
4. On souhaite savoir à partir de quelle année la production moyenne de déchets produite par chaque habitant sera inférieure à celle enregistrée en 2019 au niveau national, à savoir 513 kg. Pour cela, on considère l'algorithme suivant rédigé en langage Python.

```

1 def année():
2     n=0
3     d=537
4     while d>...:
5         n=n+1
6         d=...
7     return(n)

```

- a. Recopier et compléter l'algorithme afin de répondre au problème posé
- b. À partir de quelle année la production moyenne de déchets produite par chaque habitant sera-t-elle inférieure à celle enregistrée en 2019 au niveau national ?

Exercice 3

L'évolution d'une population de bactéries dépend de l'environnement dans lequel ces bactéries sont placées. Cette population peut être modélisée par la suite (P_n) définie, pour tout entier naturel n , par : $P_{n+1} = (1 + \alpha)P_n + \beta$, où α et β sont des paramètres liés à l'environnement, notamment à la température et à l'humidité.

P_n modélise alors le nombre de bactéries, en milliers, qui composent cette population n jours après les avoir introduites dans un certain environnement.

1. Une population, initialement composée de 500 mille bactéries, est étudiée dans un environnement pour lequel $\alpha = 0,2$ et $\beta = 70$.
 - a. Combien y a-t-il de bactéries dans cet environnement au bout de deux jours ?
 - b. Recopier et compléter le programme suivant, écrit en langage Python, pour que la fonction `Nombrebacteries` renvoie le nombre de bactéries présentes dans cet environnement au bout de N jours.

```
def Nombrebacteries(N):
    P=500
    for i in range (0,N):
        P=...
    return ...
```

2. Une autre population, initialement composée de 500 mille bactéries, est étudiée dans un nouvel environnement. On constate que le nombre de bactéries de cette population augmente de 9 % par jour.
 - a. Déterminer les valeurs des paramètres α et β pour cet environnement.
 - b. Quelle est, dans ce cas, la nature de la suite (P_n) ?
 - c. Justifier qu'après 9 jours dans cet environnement, le nombre de bactéries de cette a doublé.

Exercice 4

La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température de ce corps et celle du milieu environnant.

Une tasse de café est servie à une température initiale de 80 °C dans un milieu dont la température, exprimée en degré Celsius, supposée constante, est notée M .

Le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café en appliquant la loi de Newton suivant deux modèles. L'un, dans la partie A, utilise une suite; l'autre, dans la partie B, utilise une fonction.

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Dans cette partie, pour tout entier naturel n , on note T_n la température du café à l'instant n , avec T_n exprimé en degré Celsius et n en minute. On a ainsi $T_0 = 80$.

On modélise la loi de Newton entre deux minutes consécutives quelconques n et $n + 1$ par l'égalité :

$$T_{n+1} - T_n = k(T_n - M)$$

où k est une constante réelle.

Dans la suite de la partie A, on choisit $M = 10$ et $k = -0,2$.

Ainsi, pour tout entier naturel n , on a : $T_{n+1} - T_n = -0,2(T_n - 10)$.

1. D'après le contexte, peut-on conjecturer le sens de variations de la suite (T_n) ?
2. Montrer que pour tout entier naturel n : $T_{n+1} = 0,8T_n + 2$.
3. On pose, pour tout entier naturel n : $u_n = T_n - 10$.
 - a. Montrer que (u_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme u_0 .
 - b. Montrer que, pour tout entier naturel n , on a : $T_n = 70 \times 0,8^n + 10$.
 - c. Déterminer la limite de la suite (T_n) .
 - d. Retrouver par le calcul que la suite (T_n) est décroissante.

Exercice 5

On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et pour tout entier naturel :

$$n \geq 1, u_{n+1} = 2u_n + 1.$$

1. Calculer u_2 et u_3 .
2. Recopier puis compléter la fonction informatique suivante programmée en langage Python afin qu'elle renvoie le terme u_n pour $n \geq 1$.

```

1 def terme_u(n):
2     u=...
3     for i in range(...):
4         u=...
5     return u

```

3. Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on pose :

$$v_n = u_n + 1.$$

- a. Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 2.
- b. Donner une expression de v_n en fonction de n .
- c. En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a :

$$u_n = 2^n - 1.$$

4. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .

5. Conjecturer la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 6

Le directeur d'une réserve marine a recensé 3 000 cétacés dans cette réserve au 1^{er} juin 2017. Il est inquiet car il sait que le classement de la zone en « réserve marine » ne sera pas reconduit si le nombre de cétacés de cette réserve devient inférieur à 2 000.

Une étude lui permet d'élaborer un modèle selon lequel, chaque année :

- entre le 1^{er} juin et le 31 octobre, 80 cétacés arrivent dans la réserve marine;
- entre le 1^{er} novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5 % de son effectif par rapport à celui du 31 octobre qui précède.

On modélise l'évolution du nombre de cétacés par une suite (u_n) . Selon ce modèle, pour tout entier naturel n , u_n désigne le nombre de cétacés au 1^{er} juin de l'année 2017 + n . On a donc $u_0 = 3000$.

1. Justifier que $u_1 = 2926$.
2. Justifier que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,95u_n + 76$.
3. À l'aide d'un tableur, on a calculé les 8 premiers termes de la suite (u_n) . Le directeur a configuré le format des cellules pour que ne soient affichés que des nombres arrondis à l'unité.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	n	0	1	2	3	4	5	6	7
2	u_n	3 000	2 926	2 856	2 789	2 725	2 665	2 608	2 553

Quelle formule peut-on entrer dans la cellule C2 afin d'obtenir, par recopie vers la droite, les termes de la suite (u_n) ?

5. On désigne par (v_n) la suite définie par, pour tout entier naturel n , $v_n = u_n - 1520$.
 - a. Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,95 dont on précisera le premier terme.
 - b. En déduire que, pour tout entier naturel n , $u_n = 1\,480 \times 0,95^n + 1520$.
 - c. Déterminer la limite de la suite (u_n) .
6. Recopier et compléter l'algorithme suivant pour déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2 000.

```
def cétace():
    n=0
    u=3000
    while.....:
        n=.....
        u=.....
    return .....
```

7. La réserve marine fermera-t-elle un jour? Si oui, déterminer l'année de la fermeture.

Exercice 7 (Métropole 2022, partie d'exercice)

Le deuxième protocole consiste à injecter initialement au patient, par piqûre intraveineuse, une dose de 2 mg de médicament puis à réinjecter toutes les heures une dose de 1,8 mg.

On suppose que le médicament se diffuse instantanément dans le sang et qu'il est ensuite progressivement éliminé.

On estime que lorsqu'une heure s'est écoulée après une injection, la quantité de médicament dans le sang a diminué de 30 % par rapport à la quantité présente immédiatement après cette injection.

On modélise cette situation à l'aide de la suite (u_n) où, pour tout entier naturel n , u_n désigne la quantité de médicament, exprimée en mg, présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la n -ième heure. On a donc $u_0 = 2$.

1. Calculer, selon cette modélisation, la quantité u_1 , de médicament (en mg) présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la première heure.
2. Justifier que, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} = 0,7u_n + 1,8$.

On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = 6 - u_n$.

- a. Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,7 dont on précisera le premier terme.
- b. Déterminer l'expression de v_n en fonction de n , puis de u_n en fonction de n .
- c. Avec ce protocole, on arrête les injections lorsque la quantité de médicament présente dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5,5 mg.
- d. Déterminer, en utilisant votre calculatrice, le nombre d'injections réalisées en appliquant ce protocole.