

Exercice n°1 :

Partie 1

1. D'après la courbe représentant la fonction dérivée f' :

- la fonction f' est positive sur $]-\infty ; -1[$ donc la fonction f est croissante sur $]-\infty ; -1[$;
- la fonction f' est négative sur $]-1 ; +\infty[$ donc la fonction f est décroissante sur $]-1 ; +\infty[$.

2. D'après la courbe représentant la fonction dérivée f' :

- la fonction f' est décroissante sur $]-\infty ; 0[$ donc la fonction f est concave sur cet intervalle ;
- la fonction f' est croissante sur $]0 ; +\infty[$ donc la fonction f est convexe sur cet intervalle.

Partie 2

On admet que la fonction f mentionnée dans la Partie 1 est définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = (x+2)e^{-x}$.

1. Pour tout nombre réel x , $f(x) = (x+2)e^{-x} = xe^{-x} + 2e^{-x} = \frac{x}{e^x} + 2e^{-x}$.

D'après le cours : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

On en déduit que la courbe \mathcal{C} admet la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, comme asymptote horizontale en $+\infty$.

On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

2. a. $f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+2) \times (-1)e^{-x} = (1-x-2)e^{-x} = (-x-1)e^{-x}$.

b. Pour tout x , $e^{-x} > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $-x-1$; donc $f'(x)$ s'annule et change de signe en $x = -1$.

$f(-1) = (-1+2)e^1 = e$; on établit le tableau de variations de f sur \mathbb{R} :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$-x-1$	$+$	0	$-$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	e	0

c. Sur l'intervalle $[-2 ; -1]$, f est continue (car dérivable) et est strictement croissante à valeurs dans $[0 ; e]$.

Or $2 \in [0 ; e]$, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[-2 ; -1]$.


À l'aide de la calculatrice, $\alpha \approx -1,6$.

3. $f''(x) = (-1) \times e^{-x} + (-x-1) \times (-1)e^{-x} = (-1+x+1)e^{-x} = xe^{-x}$
 $e^{-x} > 0$ pour tout x , donc $f''(x)$ est du signe de x .

- Sur $] -\infty ; 0[$, $f''(x) < 0$ donc la fonction f est concave.
- Sur $] 0 ; +\infty[$, $f''(x) > 0$ donc la fonction f est convexe.
- En $x = 0$, la dérivée seconde s'annule et change de signe donc le point A d'abscisse 0 de \mathcal{C} est le point d'inflexion de cette courbe.

Exercice n°2 :

1. a.



b. $p(\bar{D} \cap R) = p(\bar{D}) \times p_{\bar{D}}(R) = 0,75 \times 0,35 = 0,2625$.

c. On a de même $p(D \cap R) = p(D) \times p_D(R) = 0,25 \times 0,6 = 0,15$.

D'après la loi des probabilités totales :

$$p(R) = p(D \cap R) + p(\bar{D} \cap R) = 0,15 + 0,2625 = 0,4125.$$

d. Il faut trouver $p_R(\bar{D}) = \frac{p(R \cap \bar{D})}{p(R)} = \frac{0,2625}{0,4125} \approx 0,6364$, soit 0,64 au centième près.

2. a. Les tirs sont indépendants et à chaque tir la probabilité de le réussir est égale à 0,35 : la variable aléatoire X égale au nombre de réussites suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,35$.

b. $P(X = 3) = \binom{10}{3} \times 0,35^3 \times (1 - 0,35)^7 \approx 0,25$

c. À l'aide de la calculatrice, $P(X \leq 6) \approx 0,97$.

d. $P(X \geq 6) = 1 - P(X < 6) = 1 - P(X \leq 5)$.

À l'aide de la calculatrice, $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) \approx 0,0949$ soit 0,09 au centième près.

3. Soit n un entier naturel non nul.

Stéphanie réalise une série de n tirs à trois points, les tirs sont indépendants et à chaque tir la probabilité de le réussir est égale à 0,35.

Soit X_n La variable aléatoire qui compte le nombre de tirs réussis, X_n suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(n ; 0,35)$.

a. $P(X_n \geq 1) = 1 - P(X_n = 0) = 1 - \binom{n}{0} \times 0,35^0 \times (1 - 0,35)^n = 1 - 0,65^n$

b. À l'aide de la calculatrice, $1 - 0,65^{10} \approx 0,987$ et $1 - 0,65^{11} \approx 0,991$.

La valeur minimale de n pour que la probabilité que Stéphanie réussisse au moins un tir parmi les n tirs soit supérieure ou égale à 0,99 est donc $n = 11$.

Exercice n°3 :

- **QUESTION 1 : réponse B**

Résoudre les systèmes pour les différents points.

Par exemple pour le premier point,

$$\begin{cases} -2 = -4 + 3t \\ 3 = 6 - 3t \\ 4 = 8 - 6t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 1 \\ t = \frac{2}{3} \end{cases} \text{ donc ce point n'appartient pas à la droite.}$$

Idem avec les autres.

- **QUESTION 2 : réponse C**

$$\begin{cases} -2 = -4 + 3t \\ 3 = 6 - 3t \\ 4 = 8 - 6t \end{cases}$$

Donc $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$

- **QUESTION 3 : réponse D**

On prend comme vecteur directeur de la droite : $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 1-(-1) \\ 1-3 \\ -2-2 \end{pmatrix}$ d'où $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$

On prend comme point A(1 ; 1 ; -2)

D'où

$$\begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = 1 - 2t' \\ z = -2 - 4t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$$

- **QUESTION 4 : réponse D**

$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}' \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$ sont tels que $\vec{u} = 1,5\vec{u}'$ donc d et d' sont parallèles (au sens large).

d passe par A(1 ; 1 ; -2), donc testons si ce point appartient ou pas à d' en résolvant le système :
$$\begin{cases} 1 = -4 + 3t \\ 1 = 6 - 3t \\ -2 = 8 - 6t \end{cases}$$

La résolution de ce dernier conduit sans peine à : $t = \frac{5}{3}$ pour chacune des trois équations. Donc ce système est compatible, et A appartient bien à d' (c'est le point de paramètre 5/3 de d').

Donc les deux droites sont confondues car parallèles et ayant un point en commun.

- **QUESTION 5 : réponse A**

$$\begin{cases} -2 \times 1 - 1,5 \times (-2) = 1 \\ -2 \times (-1) - 1,5 \times (-2) = 5 \\ -2 \times 3 - 1,5 \times 1 = -7,5 \end{cases}$$

- **QUESTION 6 : réponse B**

Le milieu de [FG] a pour coordonnées (0,5 ; 1 ; 1)

- **QUESTION 7 : réponse D**

$$f'(x) = \frac{2e^{2x}(e^{2x} + 1) - 2e^{2x}(e^{2x} - 1)}{(e^{2x} + 1)^2}$$

D'où $f'(x) = \frac{4e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$

- **QUESTION 8 : réponse C**

$$f(x) = \frac{e^{2x}(1 - e^{-2x})}{e^{2x}(1 + e^{-2x})}$$

D'où $f(x) = \frac{(1 - e^{-2x})}{(1 + e^{-2x})}$

D'où la limite de $f(x)$ en $+\infty$ est 1

La courbe de f admet une asymptote en $+\infty$ d'équation $y = 1$

Exercice n° 4 :

I – Premier modèle

En 10 minutes la température a augmenté de $1,3 - (-19) = 1,3 + 19 = 20,3$ soit une augmentation de $2,03$ °C.

Selon ce premier modèle l'augmentation de la température serait au bout de 25 minutes de $25 \times 2,03 = 50,75$ (°C).

Les gâteaux seraient donc à une température de $-19 + 50,75 = 31,75$ (°C) alors que la température ambiante est de 25 °C : c'est impossible, donc ce modèle n'est pas pertinent.

II – Second modèle

1. On a $T_{n+1} - T_n = -0,06 \times (T_n - 25) \iff T_{n+1} - T_n = -0,06T_n + 1,5 \iff T_{n+1} = T_n - 0,06T_n + 1,5 \iff T_{n+1} = 0,94T_n + 1,5$.
2. + Avec $n = 0$, la relation précédente donne $T_1 = 0,94 \times (-19) + 1,5 = 1,5 - 17,86 = -16,36$;
+ Avec $n = 1$, la relation précédente donne $T_2 = 0,94 \times (-16,36) + 1,5 = 1,5 - 15,3784 = -13,8784$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ la propriété : $T_n \leq 25$.

Initialisation : $T_0 = -19$ et $-19 \leq 25$, donc la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité : Soit n un entier naturel fixé.

On suppose que pour cet entier là $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que : $T_n \leq 25$.

Montrons alors sous cette hypothèse que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire montrons que $T_{n+1} \leq 25$.

Or par hypothèse de récurrence, $T_n \leq 25$, donc $0,94T_n \leq 25 \times 0,94$ (car $0,94 > 0$), donc $0,94T_n + 1,5 \leq 25 \times 0,94 + 1,5$ donc $T_{n+1} \leq 23,5 + 1,5$ donc $T_{n+1} \leq 25$: $P(n+1)$ est donc vraie.

Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n , elle l'est aussi au rang $n + 1$.

D'après le principe de récurrence : quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $T_n \leq 25$.

Ceci correspond à une évidence : la température des gâteaux ne peut dépasser la température ambiante.

4. On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+1} - T_n = -0,06 \times (T_n - 25)$.

D'après la question précédente $T_n \leq 25$ soit en multipliant par 0,06 :

$$0,06T_n \leq 0,06 \times 25, \text{ ou } 0,06T_n \leq 1,5$$

et en prenant les opposés : $-1,5 \leq -0,06T_n$ et enfin en ajoutant à chaque membre 1,5 :

$$0 \leq -0,6T_n + 1,5.$$

On a donc démontré que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+1} - T_n \geq 0$: la suite (T_n) est donc croissante.

5. On a donc démontré que la suite (T_n) est croissante et majorée par 25 : elle converge donc vers une limite ℓ telle que $\ell \leq 25$.

6. On pose pour tout entier naturel n , $U_n = T_n - 25$.

a. Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = T_{n+1} - 25 = 0,94T_n + 1,5 - 25$ ou encore

$$U_{n+1} = 0,94T_n - 23,5 = 0,94 \left(T_n - \frac{23,5}{0,94} \right) = 0,94(T_n - 25), \text{ soit finalement } T_{n+1} = 0,94U_n$$

cette égalité montre que la suite (U_n) est une suite géométrique de raison 0,94 et de premier terme $U_0 = T_0 - 25 = -19 - 25 = -44$.

b. On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $U_n = U_0 \times 0,94^n$ ou

$$U_n = -44 \times 0,94^n.$$

Or $U_n = T_n - 25 \iff T_n = U_n + 25$ ou encore $T_n = -44 \times 0,94^n + 25$, soit finalement :

$$T_n = 25 - 44 \times 0,94^n, \text{ quel que soit } n \in \mathbb{N}$$

c. Comme $0 < 0,94 < 1$, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,94^n = 0$, d'où par somme de limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = \ell = 25.$$

7. a. On a $T_{25} = 25 - 44 \times 0,97^{25} \approx 15,632$ soit environ 16°C .

b. La calculatrice donne $T_{17} \approx 9,63$ et $T_{18} \approx 10,55$, donc Cécile devra déguster son gâteau entre la 17^e et la 18^e minute après sa sortie.

c.

def seuil() :

n=0

T = -19

while T < 10 :

 T=0.94*T+1.5

 n = n+1

return n