

Exercice 1

Partie 1: (E):  $Y' = \alpha Y$  où  $\alpha > 0$ .


1a) (E) a pour ensemble de solutions:  $\left\{ \begin{array}{l} [0; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto Y(t) = \lambda e^{\alpha t}, \text{ où } \lambda \in \mathbb{R} \end{array} \right\}$ .

de plus,  $Y(0) = N$ , donc  $\lambda e^0 = N$ , donc  $\lambda = N$ .

L'unique solution de (E) avec la condition initiale  $Y(0) = N$  est la fonction  $Y$  définie

sur  $[0; +\infty[$  par:  $Y(t) = N e^{\alpha t}$

1b)  $N > 0$  et  $\alpha > 0$ , donc  $Y$  croît sur  $[0; +\infty[$  (car  $Y'(t) = N\alpha e^{\alpha t} > 0$ ).



Partie 2: (F):  $Y' = \alpha Y \left(1 - \frac{Y}{k}\right)$  où  $k \in \mathbb{N}^*$ .

$f$  est solution de (F) sur  $[0, +\infty[$  et  $f(0) = N$ .  $f(t) > 0$  sur  $[0, +\infty[$ .

$$\forall t \in [0, +\infty[, z(t) = \frac{1}{f(t)} \iff f(t) = \frac{1}{z(t)}$$

$$\text{Donc } f'(t) = -\frac{z'(t)}{z^2(t)}$$

$$\text{Or } f \text{ solution de (F): } Y' = rY(1 - \frac{Y}{k}) \text{ donc: } f'(t) = r f(t) \left(1 - \frac{f(t)}{k}\right)$$

$$\text{Donc: } -\frac{z'(t)}{z^2(t)} = \frac{r}{z(t)} \left(1 - \frac{1}{k z(t)}\right)$$

$$z'(t) = z^2(t) \times \frac{r}{z(t)} \left(\frac{1}{k z(t)} - 1\right)$$

$$z'(t) = r z(t) \left(\frac{1}{k z(t)} - 1\right)$$

$$z'(t) = \frac{r}{k} - r z(t)$$

Donc  $z$  est solution de (E<sub>2</sub>) sur  $[0, +\infty[$ , où (E<sub>2</sub>):  $z' = \frac{r}{k} - r z$

2b)  $z' = -r z + \frac{r}{k}$  est de type:  $z' = a z + b$  où  $a = -r$  et  $b = \frac{r}{k}$ .

La solution de (E<sub>2</sub>) sur  $\mathbb{R}$  s'écrit de la forme sur  $[0, +\infty[$  par:

$$z(t) = \lambda e^{-rt} - \frac{r}{(-r)} = \lambda e^{-rt} + \frac{1}{k}$$

Or ici,  $f(0) = N$ , donc  $z(0) = \frac{1}{f(0)} = \frac{1}{N}$ .

$$z(0) = \frac{1}{N} \iff \lambda + \frac{1}{k} = \frac{1}{N} \iff \lambda = \frac{1}{N} - \frac{1}{k} = \frac{k-N}{kN}$$

$$\text{Donc } \forall t \in [0, +\infty[, \boxed{z(t) = \frac{k-N}{kN} e^{-rt} + \frac{1}{k}}$$


$$2c) \boxed{f(t)} = \frac{1}{z(t)} = \frac{1}{\frac{R-N-rt}{RN} e^{-rt} + \frac{1}{R}} = \boxed{\frac{RN}{(R-N)e^{-rt} + N}} \quad (*)$$

2d)  $r > 0$ , donc comme  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ ,  $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-rt} = 0$  (composition), donc par produit, somme et quotient:  $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = R$


$$2e) f(t) = RN \times \frac{1}{(R-N)e^{-rt} + N} = RN \times \frac{1}{u(t)} \quad \text{où } \begin{cases} u(t) = (R-N)e^{-rt} + N \\ u'(t) = -r(R-N)e^{-rt} \\ u''(t) = r^2(R-N)e^{-rt} \end{cases}$$

$$f'(t) = RN \times \frac{-u'(t)}{u^2(t)} = \frac{RNr(R-N)e^{-rt}}{((R-N)e^{-rt} + N)^2}$$

Si  $N > R$ :  $R-N < 0$  et comme  $R, N, r > 0$  et  $e^{-rt} > 0$ , on a:  $f'(t) < 0$   
 $f$  décroît sur  $[0; +\infty[$  (car  $f(0) = N$  et  $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = R$ )



Si  $N > 0$  et  $N$  proche de 0: alors comme  $k > 0$ ,  $R-N > 0$  et cette fois-ci  $f'(t) > 0$  sur  $[0; +\infty[$ .



2f) Modèle (E): multiplication sans limite des lièvres: modèle pas réaliste!

Modèle (F): A long terme, stabilisation du nombre de lièvres à  $K$  avec un modèle croissant si très peu de lièvre au début, et modèle décroissant si  $N > k$ .

Pour une interprétation biologique de  $k$ , je dirais que c'est l'effectif de la population de lièvres à long terme, mais ceci n'a rien de très biologique !!!! Je laisse ça aux pro de la SVT.

## Exercice II

1)  $A =$  "au moins deux élèves ont la même date d'anniversaire"

$\bar{A} =$  "aucun élève n'a la même date d'anniversaire"

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) \text{ Oui}$$

$$\text{Or } P(\bar{A}) = \frac{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdot \dots \cdot (365 - 23)}{365^{23}} \rightarrow \text{util. les arrangements.} = \frac{365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot 343}{365^{23}} = \frac{365!}{365^{23} \cdot 32!} = \frac{365!}{365^{23} \cdot (365 - 23)!}$$

$$\text{donc } P(A) = 1 - \frac{365!}{365^{23} \cdot 342!} \approx 1 - 0,49 \approx 0,51$$

Dans une classe de 23 élèves, la probabilité qu'il y ait au moins deux élèves qui aient la même date d'anniversaire est de 51% Oui

2) Dans une classe de 30 élèves, la probabilité est de 71%

$$P(A) = 1 - \frac{365!}{365^{30} \cdot (365 - 30)!} = 1 - \frac{365!}{365^{30} \cdot 335!} \approx 1 - 0,29 \approx 0,71$$

• Dans une classe de 35 élèves, la probabilité est de 81%

$$P(A) = 1 - \frac{365!}{365^{35} \cdot (365 - 35)!} = 1 - \frac{365!}{365^{35} \cdot 330!} \approx 1 - 0,19 \approx 0,81$$

• Dans une assemblée de 50 personnes, la probabilité est de 97%

$$P(A) = 1 - \frac{365!}{365^{50} \cdot (365 - 50)!} = 1 - \frac{365!}{365^{50} \cdot 315!} \approx 1 - 0,03 \approx 0,97$$

La logique de ces résultats ne sont pas surprenant puisque plus y a de personnes plus il y a de chance d'avoir des anniversaires communs, par contre la probabilité augmente très vite. Oui

## Exercice III

**47** 1. Le nombre de choix possibles est

$$\binom{42}{10} = 1471442973.$$

2. a) Le nombre d'équipes qui ne comportent que des

$$\text{filles est } \binom{22}{10} = 646646.$$

b) Le nombre d'équipes qui comportent un seul gar-

$$\text{çon est } \binom{22}{9} \times \binom{20}{1} = 9948400.$$

c) Le nombre d'équipes qui comportent autant de garçons que de filles est

$$\binom{22}{5} \times \binom{20}{5} = 408282336.$$

d) Le seul cas où il y a deux garçons de plus que de filles est six garçons et quatre filles. Le nombre d'équipes de ce type est

$$\binom{22}{4} \times \binom{20}{6} = 283529400.$$

**27 a)** Il s'agit de dénombrer les couples d'éléments distincts d'un ensemble à 4 éléments.

Le nombre de telles séquences est donc :

$$4 \times 3 = 12.$$

**b)** AC, AG, AT, CA, CG, CT,  
GA, GC, GT, TA, TC, TG

**c)** Trois nucléotides :

ACG, ACT, AGC, AGT, ATC, ATG,  
CAG, CAT, CGA, CGT, CTA, CTG  
GAC, GAT, GCA, GCT, GTA, GTC  
TAC, TAG, TCA, TCG, TGA, TGC

Quatre nucléotides :

ACGT, ACTG, AGCT, AGTC, ATCG, ATGC,  
CAGT, CATG, CGAT, CGTA, CTAG, CTGA  
GACT, GATC, GCAT, GCTA, GTAC, GTCA  
TACG, TAGC, TCAG, TCGA, TGAC, TGCA

**33 a)** Il s'agit de déterminer le nombre de permutations d'un ensemble à 12 éléments.

Ce nombre est  $12! = 479\,001\,600$ .

**b)** Le nombre de façons de ranger, tout d'abord, les copies des 7 filles, est  $7!$ . Pour chacune de ces façons de les ranger, il y a  $5!$  façons de ranger les copies des 5 garçons. Le nombre total de telles façons de ranger les 12 copies est donc  $7! \times 5! = 604\,800$ .

**c)** Si on commence par les copies des garçons, le nombre de façons de ranger les 12 copies est  $5! \times 7!$ , ce qui donne le même résultat qu'à la question précédente.

**41 1. a)** On assimile un comité à une combinaison de trois éléments parmi 36. Le nombre de tels comités est donc  $\binom{36}{3} = 7\,140$ .

**b)** Pour qu'il y ait davantage de filles que de garçons, il faut qu'il y ait trois filles et pas de garçons ou bien deux filles et un garçon.

Le nombre de comités constitués de trois filles est  $\binom{20}{3} = 1\,140$ . Le nombre de comités constitué de deux filles et un garçon est  $\binom{20}{2} \times \binom{16}{1} = 190 \times 16 = 3\,040$ . Le nombre total de comités avec davantage de filles que de garçons est donc  $1\,140 + 3\,040 = 4\,180$ .

**2. a)** Dans ce cas, l'ordre est important, mais il ne peut pas y avoir de répétitions (une personne ne peut pas

occuper deux postes). Le nombre de tels comités est donc  $36 \times 35 \times 34 = 42\,840$ .

**b)** Le nombre de comités de trois filles est alors  $20 \times 19 \times 18 = 6\,840$ .

Pour les comités de deux filles et un garçon, il y a d'abord 3 choix pour le poste occupé par le garçon. Pour chacun de ces choix, on a le choix entre 20 garçons, ce qui fait 60 possibilités.

Pour chacune de ces possibilités, le nombre de façons de choisir les filles est  $20 \times 19 = 380$ , ce qui donne en tout  $60 \times 380 = 22\,800$  comités de ce type.

Le nombre total de comités avec davantage de filles que de garçons est donc  $6\,840 + 22\,800 = 29\,640$ .

**70 a)** Le nombre de tirages possibles est

$$\binom{2n}{n} = \frac{2n!}{n!n!} = \frac{2n(2n-1)(2n-2)\dots(n+1)}{n!}.$$

**b)** S'il y a exactement  $p$  boules blanches, alors il y a exactement  $n - p$  boules rouges.

Le nombre de tirages de ce type est donc

$$\binom{n}{p} \times \binom{n}{n-p}.$$

Or par symétrie des nombres de combinaisons,

$$\binom{n}{n-p} = \binom{n}{p}.$$

Donc le nombre de tirages avec  $p$  boules blanches est

$$\binom{n}{p}^2.$$

**c)** Un tirage peut comporter entre 0 et  $n$  boules blanches.

Donc la somme  $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2$  est égale au

nombre total de tirages, c'est-à-dire  $\binom{2n}{n}$ .

**72** Le nombre de façons de constituer le groupe A est le nombre de combinaisons de 16 éléments parmi

$$32 : \binom{32}{16} = 601\,080\,390.$$

Le nombre de groupes possibles qui comportent exactement autant de filles que de garçons est  $\binom{20}{8} \times \binom{12}{8} = 62\,355\,150$ . Ce n'est pas la moitié du nombre total de groupes possibles, donc Marina a tort.

**84** Il y a quatre façons de placer la lettre N. Pour chacune de ces façons, il faut ordonner trois lettres parmi les six autres lettres du mot MOULINS. Le nombre de façons de faire cela est  $6 \times 5 \times 4 = 120$ . Donc le nombre de mots vérifiant cette contrainte est  $120 \times 4 = 480$ .

#### Exercice IV

**45 1.** Une main est une combinaison de cinq cartes parmi 52. Le nombre total de mains est donc  $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$ .

**2. a)** Une couleur en cœur est une combinaison de cinq cartes parmi les 13 cartes de cœur. Le nombre de mains de ce type est  $\binom{13}{5} = 1\,287$ .

**b)** Il y a quatre familles donc le nombre total de « couleurs » est  $1\,287 \times 4 = 5\,148$ .

**3. a)** Pour un carré de 10, la cinquième carte peut être n'importe laquelle des 48 cartes restantes.

Il y a donc 48 mains de ce type.

**b)** Il y a 13 possibilités pour la carte qui sera répétée quatre fois dans le carré, et dans chacun de ces cas 48 possibilités pour la cinquième carte. Le nombre total de carrés est donc  $13 \times 48 = 624$ .

## La quinte flush

- Avec un jeu de 52 cartes : il faut choisir la figure du début 10 choix (de l'as au 10) et la couleur, 4 choix. On a donc :

$$10 \times 4 = 40 \quad \text{combinaisons}$$

*Pour la probabilité d'avoir une quinte flush dans une main de 5 cartes, on divise le résultat précédent par le nombre total de mains de 5 cartes, soit 2598960, on trouve de l'ordre de 0,0015 %.*

5)

## Le full

- Avec un jeu de 52 cartes : on choisit la figure des trois cartes identiques soit 13 choix puis on en choisit 3 parmi les 4 puis on choisit la figure des deux cartes identiques soit 12 choix puis on en choisit 2 parmi les 4, on a donc :

$$13 \times \binom{4}{3} \times 12 \times \binom{4}{2} = 13 \times 4 \times 12 \times 6 = 3\,744 \quad \text{combinaisons}$$

Pour la probabilité d'avoir un full entre les mains est 3744/2598960 soit environ 0,0014 ou 0,14 %.

6)

## Le brelan

- Avec un jeu de 52 cartes : on choisit la figure des trois cartes identiques soit 13 choix puis on en choisit 3 parmi les 4 enfin on prend 2 autres cartes dans les 48 restantes sans oublier d'enlever les fulls :

$$13 \times \binom{4}{3} \times \binom{48}{2} - 3744 = 13 \times 4 \times 1128 - 3744 = 54\,912 \quad \text{combinaisons}$$

Pour la probabilité d'avoir un brelan dans une main on divise le résultat précédent par le nombre total de mains de 5 cartes, soit 2598960, on trouve de l'ordre de 2,1 %.

7)

## La double paires

- Avec un jeu de 52 cartes : On choisit les deux jeux de paires parmi les 13 figures, puis on choisit deux fois deux cartes parmi ces deux jeux et enfin une carte parmi les 44 restante, on a donc :

$$\binom{13}{2} \times \binom{4}{2} \times \binom{4}{2} \times \binom{44}{1} = 78 \times 6^2 \times 44 = 123\,552 \quad \text{combinaisons}$$

La probabilité d'avoir une double paire est 123552/2598960 soit environ 0,048 ou 4,8 %.

## Exercice V

1) a)  $D_1$  est le nombre de dérangements de  $E$  lorsque  $E$  est un ensemble de cardinal  $n$ .  
 Donc  $E$  est un singleton, il a un unique élément :  $E = \{x_1\}$  **Bien**  
 $\rightarrow$  il y a donc  $1! = 1$  permutation des éléments de  $E$  qui est définie par  
 $\sigma(x_1) = x_1$ . L'unique élément de  $E$  est donc forcément un point fixe.  
 Ainsi il n'existe aucune permutation de  $E$  n'ayant aucun point fixe donc aucun  
 dérangement de  $E$  :  $D_1 = 0$  **Bien**

b)  $E = \{x_1, x_2\}$ ,  $\text{card}(E) = 2$ , donc il y a  $2! = 2$  permutations  
 $\sigma = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix}$  et  $\sigma' = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_2 & x_1 \end{pmatrix}$  donc  $D_2 = 1$

c)  $E = \{x_1, x_2, x_3\}$ ,  $\text{card}(E) = 3$ , donc il y a  $3! = 6$  permutations  
 $\sigma(E) = \{(x_1, x_2, x_3), (x_1, x_3, x_2), (x_2, x_1, x_3), (x_2, x_3, x_1), (x_3, x_1, x_2), (x_3, x_2, x_1)\}$   
 donc  $D_3 = 2$  **Bien**

2) a)  $U_k$  = nombre de permutation de  $E$  ayant  $k$  points fixes ( $0 \leq k \leq n$ )  
 Pour chaque permutation ayant  $k$  points fixes, il y a  $\binom{n}{k}$  choix possibles de ces  
 $k$  points fixes. Une fois ces choix effectués, la permutation des  $n-k$  éléments  
 restants est une permutation sans point fixe, soit  $D_{n-k}$  dérangements possibles.  
 Donc le nombre de permutation ayant  $k$  points fixes noté  $U_k$  vaut  $\binom{n}{k} \times D_{n-k}$   
 $U_k = \binom{n}{k} \times D_{n-k}$  **Bien**

b)  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times D_{n-k} = \sum_{k=0}^n U_k = U_0 + U_1 + \dots + U_n = n!$  (nombre de permutations en fait)

c) •  $n=4$   $\sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} \times D_{4-k} = 4!$   
 $\binom{4}{0}D_4 + \binom{4}{1}D_3 + \binom{4}{2}D_2 + \binom{4}{3}D_1 + \binom{4}{4}D_0 = 24$   
 $\Rightarrow D_4 = 24 - 4D_3 - 6D_2 - 4D_1 - D_0 = 24 - 8 - 6 - 0 - 1 = 9$  **Bien**

•  $n=5$   
 $D_5 = 5! - \binom{5}{1}D_4 - \binom{5}{2}D_3 - \binom{5}{3}D_2 - \binom{5}{4}D_1 - \binom{5}{5}D_0$   
 $D_5 = 120 - 5D_4 - 10D_3 - 10D_2 - 5D_1 - D_0 = 120 - 45 - 20 - 10 - 1 = 44$

•  $n=6$   $D_6 = 6! - \binom{6}{1}D_5 - \binom{6}{2}D_4 - \binom{6}{3}D_3 - \binom{6}{4}D_2 - \binom{6}{5}D_1 - \binom{6}{6}D_0$  **Bien**

•  $D_7 = 7! - \binom{7}{1}D_6 - \binom{7}{2}D_5 - \binom{7}{3}D_4 - \binom{7}{4}D_3 - \binom{7}{5}D_2 - \binom{7}{6}D_1 - \binom{7}{7}D_0 = 133496$   
 •  $D_8 = 8! - \binom{8}{1}D_7 - \binom{8}{2}D_6 - \binom{8}{3}D_5 - \binom{8}{4}D_4 - \binom{8}{5}D_3 - \binom{8}{6}D_2 - \binom{8}{7}D_1 - \binom{8}{8}D_0 = 14833$   
 •  $D_{10} = 10! - \binom{10}{1}D_9 - \binom{10}{2}D_8 - \binom{10}{3}D_7 - \binom{10}{4}D_6 - \binom{10}{5}D_5 - \binom{10}{6}D_4 - \binom{10}{7}D_3 - \binom{10}{8}D_2 - \binom{10}{9}D_1 - \binom{10}{10}D_0 = 1334961$

3) Il y a  $D_{10}$  possibilités qu'aucune des personnes ne reparte avec son chapeau et il y a  $10!$  possibilités de permutations **Bien**

$P_1 = \frac{D_{10}}{10!} = \frac{1334961}{3628800} \approx 0,37 \approx 37\%$  **Bien**


La probabilité qu'aucune des personnes ne reparte avec le chapeau avec lequel elle était arrivée est de 0,37 **Bien**

• L'évènement contraire de "au moins une des personnes repart avec le chapeau avec lequel elle était arrivée" est celui défini précédemment. **Bien**

$P_2 = 1 - \frac{D_{10}}{10!} = 1 - \frac{1334961}{3628800} \approx 0,63 \approx 63\%$

• La probabilité qu'il y ait au moins une personne est 1,7 fois plus importante que celle qu'il n'y ait personne **Bien**

## Exercice VI



$$\begin{aligned} \text{card}(E) &= n, & \text{card}(F) &= m \\ \text{card}(E \cup F) &= \text{card}(E) + \text{card}(F) \\ &= n + m \end{aligned}$$

- $\binom{n+m}{r}$  est le nombre de combinaisons de  $r$  éléments (le nombre de sous-ensemble de cardinal  $r$ ) parmi la réunion des ensembles  $E$  et  $F$  de cardinal  $n+m$ . *Bien.*
- Parmi ces combinaisons, on peut dénombrer celles qui possèdent:
  - 0 élément de  $E$  et  $r$  éléments de  $F$  soit  $\binom{n}{0} \binom{m}{r}$  *Bien.*
  - 1 élément de  $E$  et  $r-1$  éléments de  $F$  soit  $\binom{n}{1} \binom{m}{r-1}$
  - ...
  - $r$  élément de  $E$  et 0 éléments de  $F$  soit  $\binom{n}{r} \binom{m}{0}$

En généralisant, pour tout entier  $r$  tel que  $0 \leq r \leq n+m$  on a bien

$$\binom{n+m}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \binom{m}{r-k}$$

*Bien.*

## Exercice VII

**82 1. a)** Il y a une seule partition de cet ensemble en une partie, c'est l'ensemble lui-même. Ainsi  $S_2^1 = 1$ .

Il y a une seule partition de cet ensemble en deux parties :  $\{a\}$  et  $\{b\}$ . Ainsi  $S_2^2 = 1$ .

**b)** Voici les trois partitions de cet ensemble en 2 parties :

$\{a\}$  et  $\{b; c\}$ ,  $\{b\}$  et  $\{a; c\}$ ,  $\{c\}$  et  $\{a; b\}$ .

**c)** Il y a une seule partition de  $E$  en une partie, donc  $S_3^1 = 1$ .

On a vu qu'il y a trois partitions de  $E$  en deux parties, donc  $S_3^2 = 3$ .

Il y a une seule partition de  $E$  en trois parties :  $\{a\}$ ,  $\{b\}$  et  $\{c\}$ . Donc  $S_3^3 = 1$ .

**d)** Pour tout entier naturel  $n$ , il y a une unique partition de  $E$  en une partie, c'est l'ensemble  $E$  lui-même, et une unique partition de  $E$  en  $n$  parties, celle constituée de  $n$  parties à 1 élément.

Donc pour tout entier naturel  $n$ ,  $S_n^1 = 1$  et  $S_n^n = 1$ .

**2. a)** La notation  $S_4^2$  représente le nombre de partitions d'un ensemble à 4 éléments en deux parties.

Prenons par exemple l'ensemble  $E = \{a ; b ; c ; d\}$ .

Voici ses partitions en deux parties :

$\{a\}$  et  $\{b ; c ; d\}$

$\{b\}$  et  $\{a ; c ; d\}$

$\{c\}$  et  $\{a ; b ; d\}$

$\{d\}$  et  $\{a ; b ; c\}$

$\{a ; b\}$  et  $\{c ; d\}$

$\{a ; c\}$  et  $\{b ; d\}$

$\{a ; d\}$  et  $\{b ; c\}$

Ainsi,  $S_4^2 = 7$ .

**b)** Voici les partitions de  $E = \{a ; b ; c ; d\}$  en trois parties :

$\{a\}, \{b\}$  et  $\{c ; d\}$

$\{a\}, \{c\}$  et  $\{b ; d\}$

$\{a\}, \{d\}$  et  $\{b ; c\}$

$\{b\}, \{c\}$  et  $\{a ; d\}$

$\{b\}, \{d\}$  et  $\{a ; c\}$

$\{c\}, \{d\}$  et  $\{a ; b\}$

Ainsi,  $S_4^3 = 6$ .

On pose  $F = \{a ; b ; c ; d ; e\}$

Voici les partitions de F en trois parti

$\{a\}, \{b\}$  et  $\{c; d; e\}$

$\{a\}, \{c\}$  et  $\{b; d; e\}$

$\{a\}, \{d\}$  et  $\{b; c; e\}$

$\{a\}, \{e\}$  et  $\{b; c; d\}$

$\{b\}, \{c\}$  et  $\{a; d; e\}$

$\{b\}, \{d\}$  et  $\{a; c; e\}$

$\{b\}, \{e\}$  et  $\{a; c; d\}$

$\{c\}, \{d\}$  et  $\{a; b; e\}$

$\{c\}, \{e\}$  et  $\{a; b; d\}$

$\{d\}, \{e\}$  et  $\{a; b; c\}$

$\{a; b\}, \{c; d\}$  et  $\{e\}$

$\{a; b\}, \{c; e\}$  et  $\{d\}$

$\{a; b\}, \{d; e\}$  et  $\{c\}$

$\{a; c\}, \{b; d\}$  et  $\{e\}$

$\{a; c\}, \{b; e\}$  et  $\{d\}$

$\{a; c\}, \{d; e\}$  et  $\{b\}$

$\{a; d\}, \{b; c\}$  et  $\{e\}$

$\{a; d\}, \{b; e\}$  et  $\{c\}$

$\{a; d\}, \{c; e\}$  et  $\{b\}$

$\{a; e\}, \{b; c\}$  et  $\{e\}$

$\{a; e\}, \{b; e\}$  et  $\{c\}$

$\{a; e\}, \{c; e\}$  et  $\{b\}$

$\{b; c\}, \{d; e\}$  et  $\{a\}$

$\{b; d\}, \{c; e\}$  et  $\{a\}$

$\{b; e\}, \{c; d\}$  et  $\{a\}$

Ainsi,  $S_5^3 = 25$ .

---

**c)**  $S_4^2 = 7$  et  $S_3^1 + 2S_3^2 = 1 + 2 \times 3 = 7$

donc  $S_4^2 = S_3^1 + 2S_3^2$ .

$S_4^3 = 6$  et  $S_3^2 + 3S_3^3 = 3 + 3 \times 1 = 6$

donc  $S_4^3 = S_3^2 + 3S_3^3$ .

**d)** On conjecture que  $S_5^3 = S_4^2 + 3S_4^3$ .

$S_5^3 = 25$  et  $S_4^2 + 3S_4^3 = 7 + 3 \times 6 = 25$  donc cette relation est vraie.

**e)** On peut conjecturer que, pour tous nombres entiers naturels non nuls  $n$  et  $p$ , avec  $p \leq n$ ,  
 $S_n^p = S_{n-1}^{p-1} + pS_{n-1}^p$ .

**3. a)** Si une des parties est  $\{x\}$ , alors les  $p - 1$  autres parties forment une partition d'un ensemble à  $n - 1$  éléments.

Le nombre de telles partitions de  $E$  est donc  $S_{n-1}^{p-1}$ .

**b)** Si aucune des parties n'est  $\{x\}$ , alors il faut que les  $p$  parties constituent une partition de l'ensemble des  $n - 1$  autres éléments. Le nombre de telles partitions est  $S_{n-1}^p$ . Puis, il faut choisir dans laquelle de ces  $p$  parties on met l'élément  $x$  - il y a  $p$  façons de faire ce choix.

Le nombre total de telles partitions est donc  $pS_{n-1}^p$ .

**c)** Les partitions de l'ensemble  $E$  sont de deux types : celles dont une partie est  $\{x\}$ , et celles dont ce n'est pas une partie. D'après la question précédente, on a donc bien  $S_n^p = S_{n-1}^{p-1} + pS_{n-1}^p$ .

**d)** Voici le triangle que l'on obtient en utilisant la relation démontrée à la question précédente.

1					
1	1				
1	3	1			
1	7	6	1		
1	15	25	10	1	
1	31	90	65	15	1

**4. a)** Le programme n'est pas correct. Il faut écrire

$$S = \text{Part}(n-1, p-1) + p * \text{Part}(n-1, p).$$

**b)** On retrouve bien les mêmes valeurs.

**5a)** 0 car un entier impair n'est jamais la somme d'entiers tous pairs !

**5b)** On choisit la première paire : 2 parmi 8 puis la seconde paire, 2 parmi 6, puis la troisième paire, 2 parmi 4 et enfin la dernière paire, 2 parmi 2.

Au total, principe multiplicatif, on a :  $\binom{8}{2} \times \binom{6}{2} \times \binom{4}{2} \times \binom{2}{2} = 2520$  partitions d'un ensemble à 8 éléments en paires.

**5c)**

De même qu'à la question précédente, on choisit la première paire :  $\binom{2n}{2}$  choix, puis on choisit la seconde paire :  $\binom{2n-2}{2}$  choix et ainsi de suite jusqu'au choix de la dernière paire :  $\binom{2}{2} = 1$  choix.

D'après le principe multiplicatif, on a  $N = \binom{2n}{2} \times \binom{2n-2}{2} \times \dots \times \binom{2}{2} = \prod_{k=0}^{n-1} \binom{2n-2k}{2}$ .

$$N = \frac{(2n)!}{(2n-2)! \times 2!} \times \frac{(2n-2)!}{(2n-4)! \times 2!} \times \dots \times \frac{2!}{2! \times 0!} = \frac{(2n)!}{2^n}$$

**Remarque :** pour vérifier, on applique la précédente relation à  $n = 4$  :  $\frac{8!}{2^4} = \frac{40320}{16} = 2520$  yes !