

Nota bene : Ce travail est à remettre pour le Lundi 7 Novembre.

Vous vous mettez par groupe de deux à quatre élèves, et rendez alors une seule copie pour le groupe avec le nom de chacun des élèves.

Des exercices (ou copies) identiques d'un groupe à l'autre conduiront à l'arrêt automatique de la correction de votre copie et à l'absence de note pour le DM pour le groupe ayant recopié ainsi que celui ayant fourni la solution.

AUCUN RETARD NE SERA TOLERE-PAS DE COPIE INDIVIDUELLE.

Exercice I

1) Calculer sous forme de fraction irréductible :

$$A = \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{15} \right) \times \frac{2}{7} \quad B = -\frac{3}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{\frac{2}{3} + 1}{\frac{3}{4} - \frac{11}{5}}$$

2) Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

$$a) \frac{2}{3}x - 1 = \frac{-x}{2}; \quad b) 6 - 4x = 5x - 11; \quad c) 2x - 6 = 1 - 1,32x; \quad d) \frac{x}{2} = \frac{2}{3} + \frac{x}{5}$$

$$e) (2x+3)^2 = (4x+1)(x-5); \quad f) 3(2-6x) - 2(2x-5) = x+11 + (5x-2)^2 - (5x+6)(5x-8)$$

$$g) \frac{2x-5}{3} = \frac{1-7x}{4}; \quad h) x^2 = 18; \quad i) (x+4)(x-3) - x^2 = 2 - (14-x); \quad j) 25x^3 - 16x = 0$$

$$k) \frac{x-4}{2x+5} = 0; \quad l) \frac{6x+1}{x+1} = \frac{5x}{x+2} + 1$$

3) Isoler L dans : $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. (L et g strictement positives).

Isoler r dans : $F_g = G\frac{m_1m_2}{r^2}$ (Toutes les variables sont ici positives).

Isoler m dans : $E = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$ (v , g et h strictement positives).

Exercice II

Voici des petits problèmes de mise en équation. Résolvez-les !

A) Les élèves d'une classe n'apprennent qu'une seule seconde langue étrangère.

Deux septièmes des élèves de cette classe apprennent l'allemand, la moitié des élèves apprennent l'espagnol, et les six élèves restants apprennent l'italien. Déterminer le nombre d'élèves de cette classe.

B) Trouver deux entiers consécutifs dont la différence des carrés est égale à 527.

C)
Un bambou droit (c'est-à-dire formant un angle droit avec le sol) mesure un mètre de long. Il se brise, et son extrémité touche alors le sol à une distance de 30 cm de la base de son tronc. Déterminer à quelle hauteur le bambou s'est brisé en justifiant.



Exercice III

1) Sans calculatrice, expliquer comment calculer sous forme de fraction irréductible : $\frac{16^3}{24^3 + 16^3 + 8^3}$

2) Ecrire chacune des expressions algébriques sous forme d'une seule fraction :

a) $\frac{x}{6} - \frac{5x-4}{4}$; b) $\frac{x}{x+2} - \frac{x}{x+3}$ (préciser pour quelles valeurs de x l'expression est calculable).

3) Déterminer si l'affirmation suivante est vraie ou fausse, en justifiant :

Affirmation: "Pour tous réels a et b non nuls, $\frac{1}{a+b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ "

4) En ajoutant 4^{15} et 8^{10} , on obtient une puissance de 2. Laquelle ?

Exercice IV

1) Démontrer que pour tout réel x différent de -1 et -2 , $\frac{4}{(x+1)(x+2)} = \frac{4}{x+1} - \frac{4}{x+2}$

2a) Vérifier que pour tout réel x , $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$

2b) Résoudre alors dans \mathbb{R} l'équation : $x^2 + x + 1 = \frac{7}{4}$

3) Soit ABC un triangle tel que : $AB = 8 \text{ cm}$; $BC = 9 \text{ cm}$ et $AC = 11 \text{ cm}$.

Démontrer rigoureusement que ce triangle n'est pas rectangle.

Exercice V (Pour travailler le raisonnement)

Un individu dit toujours la vérité le jeudi et le vendredi. Il ment toujours le mardi. Et les autres jours de la semaine, il ment ou dit la vérité au hasard.

Durant sept jours consécutifs, on lui demande quel est son prénom.

Voici, dans l'ordre, ses réponses lors des six premiers jours : Matt, Bob, Matt, Bob, John, Bob.

Quelle est sa réponse le septième jour, et quel jour de la semaine est-on en ce septième jour ? Justifier minutieusement votre raisonnement, en rédigeant.