Exercice 0

1) Soit $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.

$a+b=538$ et $\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline 34 & 13 \end{array}$ donc $a = 13b+34$ avec $34 < b$

Donc : $\begin{cases} a+b=538 \\ a=13b+34 \end{cases} \iff \begin{cases} a=13b+34 \\ 14b+34=538 \end{cases} \iff \begin{cases} a=13b+34 \\ b=\frac{538-34}{14}=\frac{504}{14}=36 \end{cases}$

$\begin{cases} a=13\times 36+34=502 \\ b=36 \end{cases}$ $\mathcal{S}=\{(502;36)\}$. Les entiers cherchés sont 502 et 36.

2) Soit n le nombre total de marches de l'escalier ;

$246 \leq n \leq 260$ et $n=4k+1=3l+2$ où k et l sont entiers naturels.

$n \underset{(*)}{\equiv} 1\,[4]$ et $n \underset{(**)}{\equiv} 2\,[3]$.

Or $246 \leq n \leq 260$, donc par $(*)$, $n \in \{249;253;257\}$

et par $(**)$, $n \in \{248;251;254;257;260\}$.

Par suite $n=257$ (seul élément commun aux deux listes précédentes).

L'escalier compte donc 257 marches.

3) $\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline 8 & q \end{array}$ Donc $a=bq+8$ avec $0 \leq 8 < b$ $(*)$

$\begin{array}{c|c} 2a & b \\ \hline 5 & \tilde{q} \end{array}$ Donc $2a=b\tilde{q}+5$ et $5<b$

Grâce à $(*)$, $2a=2bq+16=b\times 2q+16=b\times\tilde{q}+5$

Donc $b\times 2q+16=b\times\tilde{q}+5$

$(***)$ $b\underbrace{(\tilde{q}-2q)}_{\in\mathbb{Z}}=16-5=11$.

Par suite b est un diviseur de 11, et comme $b>8$ on a : $\boxed{b=11}$ (11 étant un nombre premier, ses seuls diviseurs dans $\mathbb{N}$ sont 1 et 11).

Exercice I

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \underbrace{111\text{----}1}_{n \text{ chiffres tous égaux à } 1.}$

0) $\boxed{\begin{array}{ll} u_1 = 1 & u_4 = 1111 \\ u_2 = 11 & u_5 = 11111 \\ u_3 = 111 & u_6 = 111111 \end{array}}$

Parmi ces termes u_3 et u_6 sont divisibles par 3 d'après le critère de divisibilité par 3.

1) $u_n = \underbrace{11\text{---}1}_{n \text{ chiffres}} = 1\times10^{n-1} + 1\times10^{n-2} + \text{---} + 1\times10^1 + 1\times10^0$ (décomposition de u_n en base 10)

$$\boxed{u_n} = \sum_{k=0}^{n-1} 10^k = 10^0 \times \frac{1-10^n}{1-10} = 1 \times \frac{1-10^n}{-9} = \boxed{\frac{10^n-1}{9}}$$

Somme des termes d'une suite géométrique de raison $q=10$ avec $q \neq 1$.

$u_n \in \mathbb{N}$ car $\mathbb{N}$ est stable par addition, donc comme $u_n = \frac{10^n-1}{9}$, on a que

$$\boxed{\frac{10^n-1}{9} \in \mathbb{N}}$$

2a) Soient a et b des réels.

développons : $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 + \cancel{a^2b} + \cancel{ab^2} - \cancel{ba^2} - \cancel{ab^2} - b^3 = a^3 - b^3$.

Ainsi on a bien : $\boxed{\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R},\ a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)}$

2b) $n \in \mathbb{N}^*$. Observons que $10^{3n} - 1 = (10^n)^3 - 1^3$: on applique la factorisation de q. 2a) avec : $a = 10^n$ et $b = 1$:

$$10^{3n} - 1 = (10^n)^3 - 1^3 = (10^n - 1)((10^n)^2 + 10^n \times 1 + 1^2)$$

donc $\boxed{10^{3n} - 1 = (10^n - 1)(10^{2n} + 10^n + 1)}$.

Or $10^{2n} \in \mathbb{N}$, $10^n \in \mathbb{N}$, $1 \in \mathbb{N}$, donc par stabilité, $10^{2n} + 10^n + 1 \in \mathbb{N}$:

Grâce au précédent encadré, on a bien que $10^{3n} - 1$ est divisible par $10^n - 1$, et ce quel que soit l'entier naturel n non nul.

2c) Par q.1 : $u_{3n} = \frac{10^{3n}-1}{9}$ et $u_n = \frac{10^n-1}{9}$.

D'après 2b) $\exists k \in \mathbb{N}$ tel que : $10^{3n-1} = k(10^n-1)$.

donc $u_{3n} = \frac{k(10^n-1)}{9} = k u_n$ avec $k \in \mathbb{N}$, donc u_n est un diviseur de u_{3n} i.e $\boxed{u_{3n} \text{ est divisible par } u_n}$.

3a) $10 \equiv 1 [3]$ donc $\forall l \in \mathbb{N}$, $10^l \equiv 1^l [3]$, donc comme $1^l = 1$, on a :

$$10^l \equiv 1 [3].$$

Par suite, $10^{2n} \equiv 1 [3]$ et $10^n \equiv 1 [3]$, donc c.c.a.s, $10^{2n} + 10^n + 1 \equiv 1+1+1 [3]$ et par transitivité, comme $3 \equiv 0 [3]$, on a : $10^{2n} + 10^n + 1 \equiv 0 [3]$, donc $\boxed{10^{2n} + 10^n + 1 \text{ est divisible par } 3}$.

3b) Grâce à 2b) : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\underbrace{10^{3n}-1}_{\text{q.1}} = \underbrace{(10^n-1)}_{\text{q.1}}(10^{2n}+10^n+1)$

$9u_{3n} = 9u_n \times 3w$ d'après q. 3a) $3 \mid 10^{2n}+10^n+1$ donc $\exists w \in \mathbb{N}$ tq $10^{2n}+10^n+1 = 3w$

donc $u_{3n} = 3u_n \times w$

avec $3u_n \in \mathbb{N}^*$ et $w \in \mathbb{N}$, donc $\boxed{u_{3n} \text{ est divisible par } 3u_n}$.

3c) Considérons les répunits de la forme : u_{3^k} où $k \in \mathbb{N}^*$:

Tout d'abord $u_{3^k} = \underbrace{11\cdots1}_{3^k \text{ chiffres}}$. Montrons que $3^k \mid u_{3^k}$:

Par récurrence sur $k \in \mathbb{N}^*$, soit $S(k)$: $3^k \mid u_{3^k}$:

Initialisation : Pour $k=1$, $3 \mid u_{3^1}$ d'après q.0.

Hérédité : Si pour un entier $k \neq 0$ fixé, $3^k \mid u_{3^k}$: $u_{3^k} = \lambda \times 3^k$ où $\lambda \in \mathbb{N}$

Alors d'après 3b), $u_{3 \times 3^k} = 3u_{3^k} \times \theta$ où $\theta \in \mathbb{N}$

Donc $u_{3^{k+1}} = 3 \times \lambda \times 3^k \times \theta$ avec λ et θ entiers.

d'après H.réc $u_{3^k} = \lambda \times 3^k$

Donc $u_{3^{k+1}} = 3^{k+1} \times \lambda\theta$ avec $\lambda\theta \in \mathbb{N}$, donc $3^{k+1} \mid u_{3^{k+1}}$

donc $\underline{S(k+1) \text{ est vraie}}$.

Conclusion : $S(1)$ est vraie et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $S(k)$ est héréditaire

donc, $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $3^k \mid u_{3^k}$.

On pose $\underline{n = 3^k : \quad n \mid u_n}$.

Comme $\{3^k ; k \in \mathbb{N}^*\}$ est un <u>ensemble infini</u> formé d'éléments 2 à 2 distincts

on a bien <u>une infinité de rép-unit de longueur n qui sont divisibles</u>

<u>par n</u>.

Exercice II

1) $x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}$; $(E) : 11x^2 - 7y^2 = 5$

Si $(x;y)$ est solution de (E), alors $11x^2 - 7y^2 = 5$ et donc $11x^2 - 7y^2 \equiv 0\,[5]$ (Si deux entiers sont égaux alors ils sont congrus modulo 5 par exemple)

ou encore : $11x^2 \equiv 7y^2\,[5]$

Or $11 \equiv 1\,[5]$, donc $11x^2 \equiv x^2\,[5]$ par C.C.A.M

la transitivité de la relation de congruence : $x^2 \equiv 7y^2\,[5]$

Enfin, $7 \equiv 2\,[5]$, donc $7y^2 \equiv 2y^2\,[5]$ et toujours par transitivité on a que : $x^2 \equiv 2y^2\,[5]$.

2)

$x \equiv -[5]$	0	1	2	3	4
$x^2 \equiv -[5]$	0	1	4	4	1

$y \equiv -[5]$	0	1	2	3	4
$2y^2 \equiv -[5]$	0	2	3	3	2

Les restes possibles ds la D.E de $\begin{cases} x^2 \text{ par } 5 \text{ sont donc } 0 ; 1 \text{ ou } 4 \\ 2y^2 \text{ par } 5 \text{ sont donc } 0 ; 2 \text{ ou } 3 \end{cases}$

3) D'après 1) $x^2 \equiv 2y^2\,[5]$, donc x^2 et $2y^2$ ont même reste ds la D.E par 5.

Grâce à q.2, on a donc que $r = 0$ (r : reste ds la D.E de x^2 et $2y^2$ par 5).

alors $5 | x$ et $5 | y$ (1er colonne de chaque tableau), donc x et y sont des multiples de 5 : $x = 5k$ avec k entier $y = 5\ell$ avec ℓ entier.

$x^2 = 25k^2$ et $y^2 = 25\ell^2$ (cela doit inciter à raisonner modulo $\underline{\underline{25}}$).

Si $(x;y)$ est solution de (E), alors $11x^2 - 7y^2 = 5$

Or $x^2 \equiv 0\,[25]$ et $y^2 \equiv 0\,[25]$

donc $11x^2 \equiv 0\,[25]$ donc $7y^2 \equiv 0\,[25]$

donc $\underbrace{11x^2 - 7y^2}_{=5} \equiv 0\,[25]$

donc $5 \equiv 0\,[25]$, donc $\underline{25 | 5 : \text{absurde}}$!

Ainsi il n'y a <u>aucun couple d'entiers solution de (E)</u> !

Exercice III

Affirmation 1 : vraie, simple application de la compatibilité de la congruence avec les puissances !

Affirmation 2 : "Si $3a \equiv 3b\ (6n)$, alors $a \equiv b\ (2n)$".

Vraie : Si $3a \equiv 3b\ (6n)$, alors $6n \mid 3a - 3b$, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tq $3a - 3b = 6n \times k$

donc $3(a-b) = 6n \times k$

Donc $a - b = 2n \times k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, donc $2n \mid a - b$, donc $a \equiv b\ (2n)$.

Affirmation 3 : "$x^2 + x + 3 \equiv 0\ (5)$" ssi $x \equiv 1\ (5)$.

Faux : Nous allons établir que si $x^2 + x + 3 \equiv 0\ (5)$, alors x n'est pas nécessairement congru à 1 modulo 5.

$\forall x \in \mathbb{Z}$, $x \equiv 0\ (5)$ ou $x \equiv 1\ (5)$ ou $x \equiv 2\ (5)$ ou $x \equiv 3\ (5)$ ou $x \equiv 4\ (5)$.

Faisons un tableau :

$x \equiv\ (5)$	0	1	2	3	4
$x^2 \equiv\ (5)$	0	1	1	4	1
$x+3 \equiv\ (5)$	3	4	0	1	2
$x^2+x+3 \equiv\ (5)$	3	0	1	0	3

Ainsi, $x^2 + x + 3 \equiv 0\ (5) \iff x \equiv 1\ (5)$ ou $x \equiv 3\ (5)$.

Faux :

$10 \equiv 10\ (15)$; $100 \equiv 10\ (15)$ car $\begin{array}{r|l} 100 & 15 \\ 10 & 6 \end{array}$

Donc $1000 = 100 \times 10 \equiv 10 \times 10 \equiv 10\ (15)$.

$10^1 \equiv 10\ (15)$; $10^2 \equiv 10\ (15)$; $10^3 \equiv 10\ (15)$. (*)

Par récurrence, prouvons que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $10^n \equiv 10\ (15)$. Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $10^n \equiv 10\ (15)$.

L'initialisation a été vérifiée grâce à (*).

Hérédité : Soit n un entier fixé non nul. Supposons que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie, c'est à dire que $10^n \equiv 10\ (15)$.

Prouvons alors que $10^{n+1} \equiv 10\ (15)$.

Or, par hypothèse de récurrence, $10^n \equiv 10\ (15)$, donc $10^n \times 10 \equiv 10 \times 10\ (15)$ (Compatibilité de $\equiv$ avec le produit).

Donc $10^{n+1} \equiv 100\ (15)$ et $100 \equiv 10\ (15)$, donc $10^{n+1} \equiv 10\ (15)$, donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Ainsi, $\mathcal{P}(1)$ est vraie, et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n)$ est héréditaire, de sorte que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $10^n \equiv 10\ (15)$: le reste dans la D.E de 10^{2016} par 15 vaut donc 10 (on applique la propriété [illegible])

Affirmation 5 : "$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $2^n - 1$ n'est jamais divisible par 9".

Faux : Contre-exemple : pour $n = 6$, $2^6 - 1 = 64 - 1 = 63$; or $63 = 9 \times 7$, donc $9 \mid 2^6 - 1$

Exercice IV

Effectuons la D.E de n par 10 : il existe un unique couple d'entiers $(a;b)$ tel que : $n = 10a+b$ et $0 \leq b < 10$ et vu que b est entier cette dernière condition s'écrit : $0 \leq b \leq 9$.

1) $\mathcal{M}(13) = \{0;13;26;39;52;65;78;91\}$.

2) $\Leftarrow$) : Si $a+4b \equiv 0\,[13]$, alors $a \equiv -4b\,[13]$ donc $10a \equiv -40b\,[13]$

Or $-40 \equiv -1\,[13]$, donc $10a \equiv -b\,[13]$, donc $10a+b \equiv 0\,[13]$, donc

Comme $n = 10a+b$, on a : $n \equiv 0\,[13]$.

$\Rightarrow$) Supposons que $n \equiv 0\,[13]$: alors comme $n = 10a+b$, $10a+b \equiv 0\,[13]$.

Donc $4(10a+b) \equiv 4 \times 0\,[13]$

$40a+4b \equiv 0\,[13]$.

Or $40 \equiv 1\,[13]$, donc $40a \equiv a\,[13]$ et par suite, $40a+4b \equiv 0\,[13]$ s'écrit $a+4b \equiv 0\,[13]$.

Par double implication, on a bien établi que : $\boxed{n \equiv 0\,[13] \Longleftrightarrow a+4b \equiv 0\,[13]}$.

3) Grâce à q.2) : Un entier n est divisible par 13 si et seulement si son nombre de dizaines augmenté de quatre fois son chiffre des unités est divisible par 13.

4) $676 = 67 \times 10 + 6$: Ici $a = 67$ et $b = 6$: $67 + 4 \times 6 = 67 + 24 = 91$ et $91 = 13 \times 7$

donc oui 676 est un multiple de 13.

$943 = 94 \times 10 + 3$: $a = 94$ et $b = 3$, donc $a+4b = 94 + 4 \times 3 = 106$.

Idem : 4652 non multiple de 13

156 556 non multiple de 13

Or $106 \,|\, 13$; $\boxed{2}$; 8 Donc 106 n'est pas multiple de 13 tout comme 943.

Exercice V

1) $n \geq 2$ et $A(n) = n^4 + 1$

Rappelons que le produit de deux entiers pair est pair et celui de deux entiers impairs est impair.

Si n est pair, alors n^4 est pair et n^4+1 est impair.

Si n est impair, alors n^4 est impair et n^4+1 est pair.

$\boxed{A(n) \text{ a donc la parité "contraire" à celle de } n}$

2) Soit $n \geq 2$: alors $n \equiv 0\,[3]$ ou $n \equiv 1\,[3]$ ou $n \equiv 2\,[3]$

Donc $n^4+1 \equiv 1\,[3]$ ou $n^4+1 \equiv 2\,[3]$ ou $n^4+1 \equiv \underbrace{2^4}_{17}+1\,[3] \equiv 2\,[3]$.

Donc $A(n) = n^4+1$ n'est jamais congru à 0 modulo 3, donc <u>$A(n)$ n'est jamais multiple de 3!</u>

3) Soit <u>d un diviseur de $A(n)$</u> : $A(n) \equiv 0\,[d]$.

Or, $A(n) = n^4+1$, donc $n^4+1 \equiv 0\,[d]$

donc $n^4 \equiv -1\,[d]$ C.C.A.S

donc $(n^4)^2 \equiv (-1)^2\,[d]$ C.C.A.P

donc $\boxed{n^8 \equiv 1\,[d]}$.

Exercice VI

a) $3^{3n} = (3^3)^n = 27^n$.

Or <u>$27 \equiv 1\,[13]$</u>, donc par <u>compatibilité de la relation de congruence avec les puissances</u> on a : $\forall n \in \mathbb{N}$, $27^n \equiv 1^n\,[13]$.

Or $1^n = 1$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $27^n \equiv 1\,[13]$, c'est à dire : $\boxed{3^{3n} \equiv 1\,[13]}$.

b) <u>$\forall n \in \mathbb{N}$</u>, $A = 3^{6n+2} + 3^{3n+1} + 1$.

$A = (3^{3n})^2 \times 3^2 + 3^{3n} \times 3^1 + 1$ (cf les règles sur les puissances!)

Grâce à q.a), $3^{3n} \equiv 1\,[13]$ et par C.C.A.P et C.C.A.S on a :

$A \equiv 1 \times 3^2 + 1 \times 3 + 1\,[13]$ avec $1 \times 3^2 + 3 + 1 = 13$ et $13 \equiv 0\,[13]$

$\boxed{A \equiv 0\,[13]}$

Ce dernier résultat signifie que <u>A est multiple de 13</u>.

Exercice VII

1) $14x^2+7y^2=10^m$ $\quad x\in\mathbb{Z},\ y\in\mathbb{Z},\ m\in\mathbb{N}^*$.

$7(2x^2+y^2)=10^m$.

Si $m=0$, alors $7(2x^2+y^2)=1$ avec $2x^2+y^2\in\mathbb{N}$, donc $7\mid 1$: impossible.

Si $m\neq 0$, alors en raisonnant modulo 7 : $14x^2\equiv 0\ (7)$ car $14\equiv 0\ (7)$ et $7\equiv 0\ (7)$.

Donc $14x^2+7y^2\equiv 0\ (7)$ (compatibilité de $\equiv$ avec l'addition).

Or, si $(x;y)\in\mathbb{Z}^2$ est solution de (*), alors $14x^2+7y^2\equiv 10^m\ (7)$.

Ensuite on aurait : $10^m\equiv 0\ (7)$ par transitivité de $\equiv$.

Ainsi $7\mid 10^m$, et donc $7\mid 10$: absurde ! En conclusion, (*) n'a aucune solutions entières !

Exercice final

Au dernier coup à jouer, l'adversaire doit se retrouver en présence d'une seule allumette (39 auront donc dû être piochées). Donc à l'avant dernier coup, lorsque le joueur qui a commencé à jouer en premier joue son tour, il doit rester 2,3,4 ou 5 allumettes (et donc 38,37,36 ou 35 allumettes ont dû être extraites du jeu auparavant).

Cela signifie donc qu'au coup d'avant joué par l'adversaire, il restait 3,4,5 ou 6 allumettes dans le jeu (et donc 37,36,35 ou 34 allumettes ont été extraites du jeu en amont).

En raisonnant sur les allumettes piochées, si le premier joueur en prend 4 et qu'il complète* après chaque tour joué par l'adversaire à 5 le nombre d'allumettes prises en deux tours, celui de l'adversaire et le sien, (il le peut car il a commencé à jouer en premier et voit le nombre d'allumettes prises par son adversaire à chaque tour), le nombre d'allumettes piochées augmente de 5 en 5, il est donc de la forme 4 + 5k, où k va représenter le nombre de paires de tours joués après le premier coup, donc lorsque k = 7, on arrive à 39 allumettes piochées quand c'est au tour de l'adversaire à jouer qui perd donc la partie car contraint de prendre cette dernière.

On peut même dire que la partie se finira en 16 coups joués.

Voici la « martingale » gagnante à coup-sûr en commençant à jouer en premier !

* : le premier en prend 4 le premier coup. Si l'adversaire en prend une, alors le coup d'après celui qui a joué en premier en prend 5 – 1 = 4, si l'adversaire en prend deux, alors le 1° joueur en prend 5 – 2 =3, etc.

Ci-dessous, une solution brillante (infiniment meilleure que celle rédigée par mes soins qui reste heuristique), qui convainc de pourquoi on est obligé d'en prendre 4 au départ a été trouvée par Rémi L. Bravo à lui !

Exercice final : (Le meilleur).

Admettons que je commence, trouvons la stratégie gagnante.
Je veux gagner donc il faut que l'adversaire prenne la dernière allumette.
Mettons cela sous forme mathématique :

- Soit $n \in \mathbb{N}$ correspondant au nombre de tours d'une partie. Un tour étant défini par l'adversaire le commençant puis moi le finissant.
- Soit $k \in \mathbb{N}$, correspondant au nombre d'allumettes que j'enlève au commencement de la partie car je la commence. Donc par définition : $\boxed{1 \leq k \leq 4}$
- Soit $a \in \mathbb{N}$, correspondant au nombre moyen d'allum enlevé chaque tour. a est un entier donc cette moyenne l'est également, c'est pourquoi nous supposons que a reste constant au cours de la partie. Ceci est possible de manière pratique car je clôture chaque tour donc je décide de la valeur de a. De plus, pour que a reste constant au cours de la partie, il faut envisager l'ensemble des coups possibles que réalise l'adversaire : il peut en enlever au maximum 4 et je pense en enlever au minimum 1 et au maximum 4. Donc : $\boxed{5 \leq a \leq 8}$ Cela nous servi

Grâce à ces 3 variables : n ; k et a nous pouvons dire que pour que je gagne, il faut : $40 - k = an + 1$ car je clôture un tour, je commence la partie et il faut que l'adversaire prenne la dernière allumette.
Donc : $\boxed{39 - k = an}$
Afin d'élaborer une stratégie gagnante, trouvons a et k.

Ludovic Cortier Remy.

$k \in \mathbb{N}$ et $1 \leq k \leq 4$ Donc : $k = 1$ ou $k = 2$ ou $k = 3$ ou $k = 4$.

Raisonnons par disjonction de cas :

- Si $k = 1$, alors : $38 = an$

  Or $D_{\mathbb{N}}(38) = \{1 ; 2 ; 19 ; 38\}$

  Donc : $an = 1 \times 38$ ou $an = 2 \times 19$.

  $\begin{cases} a = 1 \\ n = 38 \end{cases}$ ou $\begin{cases} a = 38 \\ n = 1 \end{cases}$ OU $\begin{cases} a = 2 \\ n = 19 \end{cases}$ $\begin{cases} a = 19 \\ n = 2 \end{cases}$

  Or, $a \in [5 ; 8]$ donc $a \neq 1$ ou $a \neq 2$ ou $a \neq 19$ ou $a \neq 38$.

  Donc $S = \emptyset$

  Ainsi $\underline{k \neq 1}$.

- Si $k = 2$, alors : $37 = an$.

  Or, $D_{\mathbb{N}}(37) = \{1 ; 37\}$

  Donc : $an = 1 \times 37$

  $\begin{cases} a = 1 \\ n = 37 \end{cases}$ ou $\begin{cases} a = 37 \\ n = 1 \end{cases}$

  Or, $a \in [5 ; 8]$ donc $a \neq 1$ ou $a \neq 37$.

  Donc : $S = \emptyset$

  Ainsi : $\underline{k \neq 2}$.

- Si $k = 3$, alors : $36 = an$

  Or, $D_{\mathbb{N}}(36) = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36\}$

  Donc : $an = 1 \times 36$ ou $an = 2 \times 18$ ou $an = 3 \times 12$ ou $an = 4 \times 9$

  $\begin{cases} a = 1 \\ n = 36 \end{cases}$ ou $\begin{cases} a = 36 \\ n = 1 \end{cases}$ OU $\begin{cases} a = 2 \\ n = 18 \end{cases}$ ou $\begin{cases} a = 18 \\ n = 2 \end{cases}$ OU $\begin{cases} a = 3 \\ n = 12 \end{cases}$ ou $\begin{cases} a = 12 \\ n = 3 \end{cases}$ OU $\begin{cases} a = 4 \\ n = 9 \end{cases}$ ou $\begin{cases} a = 9 \\ b = 4 \end{cases}$

  Or, $a \in [5 ; 8]$ donc : $a \neq 1$; $a \neq 36$; $a \neq 2$; $a \neq 18$; $a \neq 3$; $a \neq 12$; $a \neq 4$; $a \neq 9$

  Donc : $S = \emptyset$

  Ainsi : $\underline{k \neq 3}$

Donc : $k \neq 1$; $k \neq 2$; $k \neq 3$. Donc : $\boxed{k = 4}$ Oui

Ainsi : $35 = an$

Or, $D_{\mathbb{N}}(35) = \{1 ; 5 ; 7 ; 35\}$ ✓

Donc : $an = 1 \times 35$ ou $an = 5 \times 7$

$\begin{cases} a = 1 \\ n = 35 \end{cases}$ ou $\begin{cases} a = 35 \\ n = 1 \end{cases}$ OU $\begin{cases} a = 7 \\ n = 5 \end{cases}$ ou $\begin{cases} a = 5 \\ n = 7 \end{cases}$

Or, $a \in [5 ; 8]$ donc : $a \neq 1$; $a \neq 35$; $a \neq 7$.

Donc : $a = 5$ ou $a = 7$. Or, si lors d'un tours l'adversaire enlève 1 allumette, je ne pourrai rien faire sauf que $a = 7$. Donc $a \neq 7$.

Nous avons donc pour que je gagne :

$a = 5$ et $b = 4$.

Réciproquement : $39 \equiv 4\,[5] \iff 39 - 4 = 5n$

Donc $\boxed{a = 5 \text{ et } b = 4.}$

Donc pour gagner, il faut au commencement que j'enleve 4 allumettes puis que je fasse en sorte que $a = 5$.

- Soit $a_b \in [1;4]$, correspondant au nombre d'allumettes enlevées par l'adversaire au b-ième tour.
- Soit $g_b \in [1;4]$, correspondant au nombre d'allumettes que j'enleve au b-ieme tours.

Ainsi : $\forall b \in [1;n]$ $a_b + g_b = a = 5$

Donc : $\boxed{g_b = 5 - a_b}$

Pour conclure, il existe (bel et bien) une stratégie gagnante pour le joueur ayant commencé :

Il faut, au commencement de la partie enlever 4 allumettes. Puis, lorsque l'adversaire enleve une certaine quantité d'allumette, il faut enlever la difference entre 5 et la quantité precédemment enlevée par l'adversaire.
Et la victoire est à nous !